



# ADECUACIÓN DEL USO DEL TDRA-SBHGA EN LAS FARINGOAMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICAS.

*Estudio comparativo en dos periodos*

**UNIDAD DE URGENCIAS  
PEDIÁTRICAS HUMS**



**salud**  
servicio aragonés  
de salud

Hospital Universitario  
**Miguel Servet**

# OBJETIVOS

## MATERIAL y MÉTODO

- ✓ Objetivos
- ✓ Material y métodos
- ✓ Resultados
- ✓ Conclusiones

### Diseño

Estudio observacional  
cohortes prospectivo

### Muestra

184 pacientes  
Diagnóstico de faringitis aguda, se  
realizó TDR- SBHGA.  
Periodo: Noviembre-Diciembre 2014.

Análisis descriptivo y analítico la muestra global y estudio comparativo con estudio de 2011 entre Junio y Diciembre, con un total de 142 pacientes.

### Material y método

- Variables: criterios Centor, indicación, realización y resultado TDR-SBHGA, indicación, realización y resultado del frotis faríngeo, antibioterapia prescrita y dosificación de esta, complicaciones a corto plazo y control en Centro de Salud.

Base de datos  
Microsoft Excel

Análisis estadístico  
Programa SPSS 21



# RESULTADOS

## Estudio descriptivo de la muestra

**N= 184**

- ✓ Objetivos
- ✓ Material y métodos
- ✓ **Resultados**
- ✓ Conclusiones

Adecuación indicación TDR- SHBGA

Adecuación uso antibioterapia

Seguimiento pacientes y complicaciones

Se indicó control en su Centro de salud 72,8% de los casos (134 pacientes)

- De los cuales acuden el 48,5% (65 pacientes)

El 3,8% desarrolló una complicación:

- OMA 5 pacientes
- Neumonía 2 pacientes.



Edad media: 5,28



as 13  
años

# RESULTADOS

## Estudio analítico de la muestra

### Análisis estadístico criterios Centor y resultado TDRA- SHGBA

		Resultado TDR-SBHGA		Total			Resultado TDR-SBHGA		Total	Total
		POSITIVO	NEGATIVO				POSITIVO	NEGATIVO		
Fiebre	si	58	108	166	EDAD	<4 años	11	63	74	111
	no	8	10	18		>4 años	75	25	110	73
Total		166	118	184	Total		86	65 88	119	184
p		0,396			p		0,039		0,384	

		Resultado TDR-SBHGA		Total
		POSITIVO	NEGATIVO	
Exudado	si	52	16	68
	no	49	67	116
Total		101	83	184
p		0,000		

		Resultado TDR-SBHGA		Total
		POSITIVO	NEGATIVO	
Ausencia de tos	si	19	37	56
	no	46	82	128
Total		65	119	184
p		0,543		


# RESULTADOS

## Estudio comparativo con el año 2011


Junio-Diciembre 2011.  
N= 142

- ✓ Objetivos
- ✓ Material y métodos
- ✓ Resultados
- ✓ Conclusiones


### ➤ Indicación TDR- SHBGA en 2014




### ➤ Indicación TDR- SHBGA en 2011



### ➤ Indicación frotis faríngeo en 2014



### ➤ Indicación frotis faríngeo en 2011



- Control evolutivo: En 2014 acuden a control en su centro de salud un 11,5% mas que en 2011 (p NS).



