



XX REUNIÓN ANUAL de la
**SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA**

*Nuevos tiempos para la
Pediatría de Urgencias*

16-18 DE ABRIL DE 2015
PALACIO EUSKALDUNA

DISFAGIA COMO MOTIVO DE CONSULTA: ¿UN RETO PARA EL PEDIATRA DE URGENCIAS?

J. Lucas Hernández, R. Negrillo Ruano, R. Roldán López, S. Oliva Rodríguez-Pastor, L. Martín de la Rosa.
UGC Cuidados críticos y urgencias pediátricas.
Hospital Regional Universitario de Málaga.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



DISFAGIA

*Cualquier dificultad o anomalía en la deglución,
normalmente acompañada de dolor*

OBJETIVO

Describir datos epidemiológicos, clínicos, pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento

No existe ningún conflicto de interés que declarar en relación a este estudio

METODOLOGÍA



ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO

Servicio Urgencias
Hospital Tercer nivel
Años 2013 y 2014

INCLUSIÓN

Niños < 14 años

Motivos de consulta:

- “molestias para tragar”
- “no puede tragar”
- “dificultades para tragar”...


ANÁLISIS DATOS CUALITATIVOS

Diferencia significativa si $p \leq 0.05$.

RESULTADOS





| | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------------|
| Nº Total Pacientes | 95.000/año | Edad (media) | 6,1 años (1-13) |
| Nº Total Pacientes Disfagia | 56 | Tº evolución (mediana) | 2 días (1 – 240) |





Sexo

- Varones
- Mujeres



Pruebas complementarias

- No
- Imagen
- Tránsito
- Otras



RESULTADOS



Comparación parámetros Grupo patología funcional y Grupo otros diagnósticos

| Ítems | Disfagia origen funcional (n = 18, 32,1%) | Disfagia otros diagnósticos (n=38, 67,9%) | Significación estadística p |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| Sexo (Varones) | 83,3% | 57,9% | 0,002 |
| Edad > 7 años | 77,8% | 32,1% | 0,06 |
| Antecedentes neurológicos | 38,9% | 10,5% | 0,013 |
| Antecedentes psiquiátricos | 11,1% | 0% | 0,00 |
| Desencadenante atragantamiento | 38,9% | 2,6% | 0,00 |
| Duración > 3 días | 72,2% | 29% | 0,002 |
| Pérdida de peso | 33,3% | 0% | 0,00 |
| Reconsulta | 33,3% | 10,5% | 0,037 |
| Derivación especialista | 44,4% | 5,3% | 0,00 |
| Ingreso | 11,1% | 2,6% | 0,349 |

CONCLUSIONES



- La mayoría de los pacientes, se diagnosticaron con una anamnesis y exploración detalladas, sin necesidad de pruebas complementarias ni actuaciones urgentes.
- Aunque la patología ORL fue el diagnóstico más común, destaca la disfagia de origen funcional como segunda causa más frecuente.
- Es necesario conocer las características de estos pacientes para orientar el diagnóstico correctamente.