

# ¿HAY MARCADORES DIAGNÓSTICOS Y PRONÓSTICOS DE APENDICITIS?



Canet-Tarrés A, Martínez-Del Val E, Rubio-San  
Simón A, González-Posada A, Calderón R,  
Marín-Ferrer M.

# Objetivo y métodos

Identificar marcadores diagnósticos y pronóstico de apendicitis y de sus posibles complicaciones

- Recogida datos apendicitis durante 2013
- 254 diagnósticos de apendicitis (0-15 años)
- Estudio retrospectivo-descriptivo

## Manifestaciones clínicas por edades



- Principalmente varones mayores de 5 años  
Mediana de edad: 8,88 años (6,8- 11,3)
- Los síntomas clásicos como el dolor en FID, Blumberg y náuseas con o sin vómitos siguen siendo los más orientativos

- Prueba diagnóstica de elección




**ECOGRAFÍA: S 100% y VPP 92,9%**




Confirmación  
por Anatomía  
patológica

■ Apendicitis confirmada

■ Falsa apendicitis



### Sensibilidad




Los resultados analíticos apoyan el diagnóstico o ayudan a descartarlo, pero no son diagnósticos

**15% con analítica normal**

■ Absceso, flemón, plastrón



■ No complicaciones



**< 5 años**


■ Complicaciones

■ No complicaciones



➤ 75% pacientes con PCR > 5 mg/dl presentaron complicaciones

➤ 100% de pacientes con PCR > 7 mg/dl presentaron complicaciones



Tanto la PCR elevada como la presencia de complicaciones están relacionadas con el retraso diagnóstico

