


USO DE SEDONALGESIA EN PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL



*Valdivielso Martínez Ana I, Avilés Tirado M., Ortiz Garrido A., Cano España J., Martínez de la Rosa L, Oliva Rodríguez-Pastor S.
UGC Urgencias y Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Regional Universitario de Málaga.*

OBJETIVOS

Eficacia



Seguridad



Indicaciones

MÉTODOS

Descriptivo retrospectivo

Escalas del dolor

Escala Sedación





Tabla 1 Escala de sedación de Ramsay


1. Paciente ansioso y agitado
2. Paciente colaborador, orientado y tranquilo
3. Paciente dormido, que obedece a órdenes
4. Paciente dormido, con respuestas a estímulos auditivos intensos
5. Paciente dormido, con respuestas mínimas a estímulos
6. Paciente dormido, sin respuestas a estímulos

Adaptada de Ramsay M, et al¹⁵.


RESULTADOS

180 pacientes
Edad media 7 años
y 4 meses


SEXO




Fármaco




Servicio de procedencia



Procedimientos



Procedimientos según edad sedados con Oxido nitroso



RESULTADOS







Tabla 1 Escala de sedación de Ramsay

1. Paciente ansioso y agitado
2. Paciente colaborador, orientado y tranquilo
3. Paciente dormido, que obedece a órdenes
4. Paciente dormido, con respuestas a estímulos auditivos intensos
5. Paciente dormido, con respuestas mínimas a estímulos
6. Paciente dormido, sin respuestas a estímulos

Adaptada de Ramsay M, et al¹⁵.



CONCLUSIONES



Más empleado: óxido nitroso

Fármacos seguros

Procedimientos de traumatología y reumatología