21

REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRIA

DETERMINACIÓN DE LA PROCALCITONINA EN URGENCIAS. ¿INFLUYE SU RESULTADO EN NUESTRA DECISIÓN DIAGNÓSTICO - TERAPÉUTICA?

Patricia Miranda Romera, Juan Luis Santos Pérez, Antonio Gámiz Gámiz, Fernando Rodríguez Alemán, Antonio Del Valle De Toro, Francisco Sánchez Martínez

OBJETIVO

EVALUAR SI LOS RESULTADOS EN EL VALOR DE LA PROCALCITONINA DETERMINADOS EN URGENCIAS CONDICIONA NUESTRA ACTITUD DIAGNÓSTICO - TERAPÉUTICA EN LA FIEBRE SIN FOCO

METODOLOGÍA

TIPO DE ESTUDIO

ESTUDIO UNICÉNTRICO, DESCRIPTIVO, RETROSPECTIVO.

PERIODO DE ESTUDIO

DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015

VARIABLES

EDAD	INGRESO
PROCALCITONINA	INICIO DE ANTIBIOTICOTERAPIA

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

PROGRAMA INFORMÁTICO SPSS

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN POR EDAD
(TOTAL = 566)

- <1 m
- 1 - 3 m.
- 3 - 36 m.
- >3 años

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE PCT

- <0,5 ng/ml
- 0,5 - 2 ng/ml
- >2 ng/ml

PCT >0,5 NG/ML → 142

{ 0,5 - 2 NG/ML: 93 (65,5%)
>2 NG/ML: 49 (34,5%)

RESULTADOS

★ **PCT 0,5 - 2 NG/ML**

- Sí
- No
- Previamente iniciado

Ingreso

Antibiótico

★ **PCT > 2 NG/ML**

- Sí
- No
- Previamente iniciado

Ingreso

Antibiótico

P = 0,006

P = 0,042

RESULTADOS

		PCT				
		0,5 - 2 ng/ml		>2 ng/ml		
		SÍ	NO	SÍ	NO	
E D A D	<1 m 5 (3,5%)		5		0	
		A	1 (20%)	4 (80%)	0 (0%)	
		I	3 (60%)	2 (40%)		
	1 - 3 m 14 (9,8%)		5		9	
		A	4 (80%)	1 (20%)	4 (44%)	5 (56%)
		I*	5 (100%)	0 (0%)	8 (89%)	1 (11%)
	3 - 36 meses 89 (62,67%)		57		32	
		A	26 (46%) * 6 (10%)	25 (44%)	25 (78%) * 3 (9%)	4 (13%)
		I	14 (23%)	44 (77%)	15 (47%)	17 (53%)
	>3 años 34 (24%)		26		8	
		A	14 (54%) * 4 (15%)	8 (31%)	6 (75%)	2 (25%)
		I	10 (38%)	16 (62%)	5 (63%)	3 (37%)

I = Ingreso
(p = 0,000)

PCT 0,5 - 2 ng/ml:
p = 0,002

PCT >2 ng/ml:
p = 0,075

A = Inicio
antibioticoterapia
(p = 0,324)

PCT 0,5 - 2 ng/ml:
p = 0,317

PCT >2 ng/ml:
p = 0,073

* Continuación de
antibioticoterapia ya
iniciada

CONCLUSIONES

- En el estudio realizado, la PCT se relacionó con:
 - Inicio precoz de antibioticoterapia.
 - Ingreso hospitalario en niños con fiebre sin foco.
- Aumento del número de ingresos e inicio de antibiótico con valores de PCT >2 ng/ml.
- Respecto a los diferentes grupos de edad...
 - Existen diferencias en el % de ingresos, siendo mayor en los rango de 1 - 3 m. Se mantienen en el grupo con PCT 0,5 - 2 ng/ml pero no en el grupo con PCT >2 ng/ml.
 - No hay diferencias en el inicio de la antibioticoterapia.
- **La valoración del rango de PCT es un parámetro útil en la toma de decisiones en la fiebre sin foco.**