

ENCUESTA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE ANALGESIA Y SEDACIÓN REALIZADOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE PEDIÁTRICOS

OBJETIVO:

1. Conocer el grado de utilización de analgesia y/o sedación para procedimientos que generan dolor y/o ansiedad en el niño y la existencia o no de protocolos para estos procedimientos.
2. Conocer el posible impacto del grupo de trabajo de analgesia y sedación en los SUP.

MÉTODO:

1. Estudio descriptivo y comparativo utilizando un cuestionario que se difundirá a través de la página web de SEUP y vía mail a todos los socios de SEUP.
2. Se analizarán los datos y se compararán con los datos obtenidos en el año 2004 del mismo cuestionario.

PERIODO:

Hasta 30 septiembre 2010 recogida de los cuestionarios.

Envío de cuestionarios a: Susana.capapezache@osakidetza.net

**Encuesta analgesia y/o sedación para procedimientos
en Urgencias de Pediatría (UP)**

Nombre y apellidos:

Centro de trabajo :

Correo electrónico :

1. ¿Cree necesaria la utilización de analgesia y/o sedación en los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos realizados en UP?

1. Si
 2. No

2. ¿En que procedimientos utiliza analgesia y/o sedación? (marque con X)

- Punción lumbar
 Heridas (sutura)
 Reducción de fracturas
 Acceso venoso (extracción analítica)
 Procedimientos diagnósticos (Ej.: realización de TAC)
 Otros.....

3 ¿Utiliza analgésicos mayores y/o sedantes vía IV para procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos mayores en UP?

1. Si, siempre
 2. Si, en algunas ocasiones
 3. No, nunca

4. ¿Utiliza anestésicos tópicos como EMLA (lidocaína+ prilocaína) o LAT (lidocaína+ adrenalina+ tetracaína)?

1. Si
 2. No

5. ¿Utiliza como alternativa a otros sedantes el oxido nitroso para ciertos procedimientos?

1. Si
 2. No

6. Para la realización de un procedimiento como p.ej la reparación de una herida inciso- contusa profunda de >10 cm en una niña de 10 años ¿Qué opción de analgesia y/o sedación utilizaría usted?

1. Lidocaína infiltrando los bordes de la herida
 2. Lidocaína infiltrando los bordes + sedación (oxido nitroso o midazolam IN)
 3. Lidocaína local en la herida + sedo analgesia (midazolam IV + fentaniloIV)

7. ¿Existen en UP de su Hospital protocolos para analgesia y/o sedación para los distintos procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos?

1. Si
 2. No

8. ¿Considera que necesita formación en analgesia y sedación?

1. Si
 2. No

9. ¿Cree útil el grupo de trabajo de analgesia y/o sedación de SEUP?

1. Si
 2. No

10. ¿Conoce la existencia del MANUAL DE ANALGESIA Y SEDCAIÓN EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA DE SEUP?

1. Si
 2. No

Susana Capapé
Susana.capapezache@osakidetza.net
Urgencias de Pediatría. Hospital de Cruces.