



CRIZA ASMATICA (CRISIS ASMATICA)

CE SUNT CRIZELE ASMATICE?

Sunt episoade repetate de tusa, dificultate de a respira (oboseala), si zgomote in piept (fluieraturi), ce se produc datorita unei reactii inflamatorii a bronhiilor. Se poate intampla din diferite cauze: guturai, alergii.

CE TREBUIE FACUT CAND APARE O CRIZA ASMATICA?

- Sa se mentina copilul in repaus, fara a se face exercitii, pana cand criza este controlata.
- Sa se inceapa a se face tratamentul recomandat de pediatru (Ventolin R, Terbasmin R), respectand instructiunile. Recomandabil este a se folosi medicamente de inhalare.
- Copilul daca are febra, sa i se administreze antitermice.
- A se evita mediul cu fum.

CAND TREBUIE CONSULTAT UN SERVICIU DE URGENTA?

- Copilul daca este foarte agitat sau prezinta somnolenta, si capata culoarea vanata sau palida.
- Daca dificultatea de a respira se inrautatesc: respira de fiecare data mai repede, misca mult abdomenul si pieptul i se scufunda.
- Se recomanda inhalatii frecvente, la fiecare doua ore.
- Cand se prezinta la serviciul de urgenta, este recomandabil sa se ia aparatul de inhalatii (cel folosit in casa).

IMPORTANT

Copiii asmatici nu sunt mereu alergici. In copilarie factorul cel mai frecvent care cauzeaza crizele asmaticе, este guturaiul.

- Crizele asmaticе uneori incep doar cu tusa. Incepand din acest moment se recomanda sa se faca inhalatii, astfel sansele de vindecare sunt mai mari.
- Cu toate ca efectul este mai scazut, cand aparatele de inhalare sunt prevazute cu dispozitive speciale, se recomanda a nu se face niciodata inhalarea direct in gura.
- Copiii cu parinti fumatori sunt mai predispusi la bolile respiratorii.