



# SEUP

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
URGENCIAS DE PEDIATRÍA

## TRAUMATISMO CRANEAL

### ¿QUÉ ES UN TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO?

Es un traumatismo en la cabeza.

En este momento su hijo presenta una exploración neurológica normal por lo que no precisa ingreso.

### ¿QUÉ DEBE HACER EN CASA?

-Observe al niño durante las 24 horas siguientes por si aparece algún problema. Manténgalo en un ambiente tranquilo bajo la supervisión de un adulto.

-Si el niño tiene sueño puede dejarle dormir, pero despertándole cada cuatro horas, aproximadamente, para observar sus reacciones. Debe mantener un comportamiento adecuado.

-Si presenta dolor de cabeza puede tomar paracetamol o ibuprofeno a dosis habituales.

-Transcurridas dos horas sin vómitos ofrézcale una dieta blanda.

-A las 24 horas del traumatismo, se puede reiniciar el ritmo normal de vida.

### ¿CUÁNDO DEBE CONSULTAR DE NUEVO EN UN SERVICIO DE URGENCIAS?

-Si el niño vomita de nuevo en casa.

-Si presenta dolor de cabeza intenso o progresivo.

-Si su hijo está confuso, somnoliento, irritable o cuesta mucho despertarle.

-Si el niño comienza con movimientos anormales, debilidad u hormigueo de extremidades, tiene dificultad para caminar, habla o ve mal o tiene las pupilas de diferente tamaño.

-Si observa salida de líquido claro o sangre por la nariz o los oídos.

-En general, cualquier síntoma que le resulte extraño o le preocupe.

### CUESTIONES IMPORTANTES

-La mayoría de los traumatismos en la cabeza son leves y no producen daños. Con golpes mínimos es muy raro que se produzcan lesiones.

-Es normal que en las primeras horas su hijo esté asustado, no recuerde el momento del traumatismo, tenga dolor de cabeza o presente algún vomito.

-En la mayoría de los casos no es necesario realizar ninguna radiografía.