

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO

الإصابة الرأسية الدماغية

ما هي الإصابة الرأسية الدماغية؟

هي إصابة تخص رأس الطفل، في هذه اللحظة لم يظهر أي شيء أثناء فحص الأعصاب لهذا لم يتم وضعه في المستشفى.

ما الواجب عمله في المنزل؟

- راقبوا المريض طيلة 24 ساعة الموالية للحادثة للتأكد من عدم ظهور أعراض أخرى.
- ضعه في مكان هادئ تحت رقابة شخص بالغ.
- إذا أراد الطفل النوم فدعه، لكن يجب إيقاظه كل 4 ساعات و التحقق من رد فعلي عادي.
- إذا اشتكى من آلام في الرأس يمكنه تناول Paracetamol أو Ibuprofeno وذلك حسب نسب عادية.
- بعد مرور ساعتين بدون قيء يمكنه تناول غداء خفيف.
- بعد 24 ساعة من الحادث، يمكن استئناف حياة طبيعية.

متى يجب التوجه إلى مصلحة الاستعجالات؟

- إذا بقي الطفل بعد رجوعه إلى المنزل.
- إذا تزايدت عليه آلام الرأس بحدة و بتكرار.
- إذا كان ابنكم فاقد الانتباه، متكاسل، يغلب عليه النوم، أو منفعل جدا، أو إذا صعب عليكم إيقاظه.
- إذا كانت حركاته غير عادية، أو ضعفت أعضائه مع تنمل الأطراف، و صعب عليه المشي، أو يتكلم بصعوبة، أو لا يرى جيدا أو كانت حدقتيه (أم العين) مختلفا الحجم.
- إذا لاحظتم خروج سائل مائي أو دم من الأنف أو الأذنين.
- أو في حالة ظهور أي شيء غريب أو مقلق.

هام جدا

- عادة ما تكون الإصابات الرأسية بسيطة و لا تحدث ضرار.
- الضربات الحقيقة قليلا ما تحدث آثار سلبية.
- عادي جدا أن يكون الطفل مندهشا و خائفا و لا يتذكر جيدا الحادث أو يتقيأ قليلا.
- في أغلب الحالات لا يستلزم إجراء فحص بالأشعة.