

VARICELA

U جدرى الماء

ما هو جدرى الماء؟ (الباريسيل أو الفاريسيل)

هو مرض فيروسي جد معدي، و يظهر على شكل حويصلات و انتفاخا جلدية مخاطبة (أو غشائية) بالفم، العيون أو الأعضاء التناسلية.

الحويصلات تولد الحك و تتحول بعد 4 أو 5 أيام إلى قشرة، و يتزامن هذا المرض مع حمى خلال الثلاثة أيام الأولى.

ماذا يجب العمل في المنزل؟

- يجب الحمام يوميا لكي تتفادى أن تتعفن المناطق المصابة.
- تقليم و تنظيف الأظافر لكي لا تتم العدوى عبر الحك.
- لا توضع مراهم أو طالك Talco على مكان الجرح.
- إذا كانت هناك حمى فواجب تناول الأدوية الموصوفة لهذا الغرض من طرف الطبيب المعالج.
- يجب تجنب لمس الأشخاص الذين لم يصابوا بهذا المرض و خاصة النساء الحوامل أو المرضى الذين لهم نقص في المناعة (سيدها، إيدز، أو سرطان) أو أشخاص مرضى و يتابعون علاجاً بالكورتيكويدس.
- يمكن الرجوع إلى المدرسة و لكن بعدما تتحول الحويصلات و الإنتفاخات إلى قشرة، عادة بعد 6 أو سبعة أيام من بداية المرض.

متى يجب التوجه إلى مصلحة الاستعجالات؟

- في حالة إصابة طفلكم بداء ينقص من المناعة (سرطان الدم أو السيدا)، أو إذا كان يتابع علاجاً بواسطة كورتيكويد عن طريق الفم أو مستنشق.
 - إذا كان الطفل مصاب بالتهاب جلدي (إكزيما).
 - إذا كان سنه لا يتجاوز 3 أشهر أو أكثر من 12 سنة.
 - إذا تدهورت حالته الصحية، و فقد حيويته، متكاسل يريد النوم بكثرة، أو يصعب نهوضه أو بالعكس هو سريع الانفعال و قابل للإثارة.
 - إذا كان الطفل يسعل كثيرا و لديه صعوبة في التنفس.
 - إذا عادت درجة الحرارة للارتفاع يعد أن زالت منذ أكثر من 24 ساعة.
 - إذا ظهرت حمى بعد 3 أيام من ظهور الحويصلات أو الانتفاخات.
 - إذا طالت الحمى أكثر من 4 أيام.
 - إذا ظهرت تورمات أو نفخ في مكان ما من الجلد.
 - إذا صاحب الانتفاخ و الحويصلات احمرار للجلد.
- هام جدا**
- عادة ما يعتبر هذا المرض بسيط بالنسبة للأطفال الأصحاء.
 - لا يجب تناول حامض الأسيتيلسليكو Aspirina