



Osakidetza
Servicio vasco de salud


DONOSTIA UNIBERTSITATE OSPITALEA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DONOSTIA



Universidad
del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitatea



EL MIEDO Y LA FIEBRE ¿CÓMO SE DEBE ACTUAR?



H.U. Donostia. Servicio de urgencias de pediatría. Abril 2015.
DUEs A. López, R. Rodríguez, S. Zabala y P. Urgel.

OBJETIVO

PRIMER
MOTIVO DE
CONSULTA




Evaluar el miedo y el conocimiento que poseen los padres, sobre el proceso febril del niño, que acuden al servicio de urgencias de pediatría.

No existe ningún conflicto de interés que declarar en relación a este estudio






METODOLOGÍA

- Revisión sistemática (Medline, Crochane, Lilacs, Embase, Cuiden y Scielo)
- Palabras clave: Feber, fiebre, fear, parents (con el operador voleano AND)
- Inglés y Español.
- Tipos de estudios: Ensayos clínicos, estudios comparativos, meta-análisis, estudios observacionales, ensayo clínico controlado y aleatorizado, revisiones y revisiones sistemáticas.
- 2009-2014.
- Edad de los niños: 0-14 años.



RESULTADOS

- Existe un desconocimiento sobre la cifra en la que los padres consideran fiebre.
- Hay una mayoría de padres que consideran fiebre cuando la cifra es menor a 38°C, independientemente del país.




Observamos que el método de toma de temperatura en un porcentaje elevado es la palpación, bien sea fijándonos en la apariencia como en el comportamiento.



RESULTADOS

- Alto porcentaje de padres que no administran antitérmicos a los niños a pesar de tener fiebre.
- Falta de información sobre dosificación y tiempos.
- Alternativas: paños, desnudar al niño, baños en agua tibia...



Administración de antipirético

COLOMBIA

- < 4 horas 4%
- > 4 – 6 horas 77%
- > 8 horas 13%
- No sabe 6%

LONDRES

- < 4 horas 70%
- > 4 – 6 horas 13%
- > 8 horas 2%
- No sabe 14%



ESKERRIK ASKO

