

# 21

REUNIÓN ANUAL  
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



*Valencia, del 14 al 16 de abril de 2016*

## **EVALUACIÓN DE LA ANALGESIA PRESCRITA DE PATOLOGÍA TRAUMÁTICA/INFECCIOSA SOBRE EL ÁREA FACIAL Y ORAL**

Gema Manrique Martín, Yurena Aguilar de la Red,  
Concepción Miguez Navarro, Gloria Guerrero López,  
Concepción González Herrero, Paula López Vázquez



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

 Comunidad de Madrid

# INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

- Estudio prospectivo, observacional, descriptivo y analítico.
  - Inclusión: niños con patología infecciosa y/o traumática facial; U oral Octubre-Noviembre 2015
  - Exclusión: pacientes sin consentimiento informado verbal telefónico
  - Aprobado por el Comité de Ética del H. Gregorio Marañón, Madrid
- Se deben usar analgésicos de forma pautada en lugar de "a demanda" al menos*

*48 h, cuando suele ser más alta la intensidad del dolor"*



Se recogieron:

- Datos epidemiológicos
- Médico que atiende
- **Objetivos:**
- Diagnóstico
- Manejo de dolor
  - Analizar el manejo infeccioso o traumático
  - Valorar la opinión prescrito.

URGENCIAS
<b>Valoración del grado de dolor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Triage</li> <li>• Sala exploración</li> </ul>
<b>Tratamiento administrado en Urgencias:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vía</li> <li>• Fármaco</li> </ul>
<b>Prescripción al alta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo (pautada, a demanda, + rescate)</li> <li>• Fármaco</li> </ul>


DOMICILIO
<b>Tratamiento administrado en domicilio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo (pautada, a demanda, + rescate)</li> <li>• Fármaco</li> </ul>
<b>Reconsulta</b>
<b>Disminución ingesta</b>
<b>Adecuación de la analgesia al dolor</b>
<b>Grado satisfacción analgesia (0-10)</b>

Las variables cuantitativas se expresaron en medias (DE), cualitativas como frecuencias y porcentajes. Test de chi-cuadrado o Mann-Whitney, según si la variable era o no categórica.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses

# RESULTADOS

- 302 pacientes valorados por este motivo → 252 (83,4%) con consentimiento
- Edad media: 4,5 años (DE 3,9); 57,9% varones
- Valorados por pediatras/ cirujanos: 49,6% vs 50,4%




N = 252

# RESULTADOS

## Tasa de reconsulta por dolor:

### Tipo de analgesia:




### PRESCRIPCIÓN AL ALTA

#### Prescripción de analgesia:

- "a demanda": 60,3%
- Pautada: 25,4%
- Pediatras: 67,2%
- Cirujanos: 32,8%

#### Fármaco pautado:

- Ibuprofeno: 90,3%
- Paracetamol: 8,3%



20% 17,50% 18,20%

### MANEJO EN DOMICILIO

#### Tipo de analgesia:

- No analgesia: 13,2%
- "A demanda": 23,0%
- Pautada: 36,1%

#### Fármaco administrado:

- Ibuprofeno: 70,8%
- Paracetamol: 11,7%

Oral Facial Normal Disminuída  
Por patología Según la ingesta


Disminución de la analgesia:  
Reconsulta: 4,4%

Disminución ingesta: 7,5%

#### Adecuación analgesia al dolor:

- Adecuada: 84%
- Regular: 14,8%
- Nada adecuada: 1,32%

Grado de satisfacción 9,17 (±1,2)



Buena Regular Mala

# 21

REUNIÓN ANUAL  
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA



*Valencia, del 14 al 16 de abril de 2016*

## **EVALUACIÓN DE LA ANALGESIA PRESCRITA DE PATOLOGÍA TRAUMÁTICA/INFECCIOSA SOBRE EL ÁREA FACIAL Y ORAL**

# Gracias



Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón

