

URTICARIA AGUDA EN URGENCIAS: ¿todo lo que pica es alergia?

DRA. JUDIT BARRENA CRESPO
SERVICIO DE PEDIATRÍA – ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA
CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

Introducción

- La urticaria aguda genera angustia en los padres, por lo que motiva frecuentemente que consulten en Urgencias.
- Puede crear dudas, ya que en muchas ocasiones se relaciona urticaria con alergia.


Revisión de las características de las visitas por urticaria aguda que acuden al servicio de urgencias de un hospital de segundo nivel.

Metodología

- Revisión retrospectiva de los informes con diagnóstico de urticaria aguda y/o angioedema.
- Edades: 0 días de vida hasta los 16 años.
- Periodo: 1 enero 2017 a 31 diciembre 2017.


Resultados

- Total de visitas: 26,760.
- Visitas por urticaria aguda y/o angioedema: 300 visitas (1,1%).




Resultados

- Total de visitas: 26,760.
- Visitas por urticaria aguda y/o angioedema: 300 visitas (1,1%).




- Edad media: 5,6 años.




Resultados

- Total de visitas: 26,760.
- Visitas por urticaria aguda y/o angioedema: 300 visitas (1,1%).




- Edad media: 5,6 años.





Resultados

- Total de visitas: 26,760.
- Visitas por urticaria aguda y/o angioedema: 300 visitas (1,1%).




- Edad media: 5,6 años.





Resultados


- Total de visitas: 26,760.
- Visitas por urticaria aguda y/o angioedema: 300 visitas (1,1%).




- Edad media: 5,6 años.




TIEMPO EN CONSULTAR EN URGENCIAS




TIEMPO EN CONSULTAR EN URGENCIAS




TRATAMIENTO




TIEMPO EN CONSULTAR EN URGENCIAS




TRATAMIENTO




CORTICOIDES




POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS




POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS




Infecciones




POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS




Infecciones




Alimentos




POSIBLES CAUSAS RELACIONADAS




Infecciones



Alimentos




Medicamentos




Pruebas complementarias

- Pruebas complementarias: 31 pacientes (10,3%).




- Pruebas complementarias: 31 pacientes (10,3%).

Pruebas complementarias




- Analítica sangre
- Tira reactiva de orina
- Streptest
- Radiografía

Evolución




- Pruebas complementarias: 31 pacientes (10,3%).

Pruebas complementarias




- Analítica sangre
- Tira reactiva de orina
- Streptest
- Radiografía

Evolución





Reconsulta




- Reconsultas: 14%

DERIVACIONES A ALERGOLOGÍA





ESTUDIO ALERGOLÓGICO



Conclusiones

La urticaria aguda genera intranquilidad y angustia en los padres, e incluso crea dudas en cuanto al manejo y las recomendaciones del pediatra.

El antihistamínico más utilizado en nuestro SUP sigue siendo la dexclorfeniramina (sedación) y, en más ocasiones de las que pensamos, se asocia tratamiento con corticoides orales.

Pese a que la causa infecciosa es la más frecuente, hasta un 21% de los pacientes de zona acaban siendo derivados a la Consulta Externa de Alergología pediátrica. Solo en la mitad se demuestra causa alérgica.