

DISFAGIA FÓBICA EN URGENCIAS

López de Suso Martínez de Aguirre D, Viada Bris
FJ, Jiménez García R

INTRODUCCIÓN


- La disfagia fóbica se define como la sensación de tránsito anormal del bolo a través del cuerpo esofágico en ausencia de alteración estructural, mucosa o motora.
- **OBJETIVO:** definir las características de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias por disfagia fóbica.

MATERIAL Y MÉTODOS

- Estudio unicéntrico, descriptivo y retrospectivo basado en el análisis de las historias clínicas de los pacientes que son dados de alta de Urgencias con el diagnóstico de disfagia (sin etiología identificada) entre 2016 y 2017.
- Se clasificó a los pacientes según su diagnóstico final en disfagia fóbica y de causa orgánica. Se recogieron variables clínicas, exploraciones complementarias, tratamiento y evolución.


RESULTADOS

- N: 25 (34 pacientes seleccionados, 9 excluidos)
- Causas de disfagia



RESULTADOS


- N: 25 (34 pacientes seleccionados, 9 excluidos)
- Causas de disfagia
- Mediana edad: 9 años (RIQ 7,9-12)
- Sexo



RESULTADOS

- N: 25 (34 pacientes seleccionados, 9 excluidos)
- Causas de disfagia
- Mediana edad: 9 años (RIQ 7,9-12)
- Sexo
- Antecedentes personales

Antecedentes personales



■ No Aps

■ Atopia

■ Aps gastrointestinales


■ Aps psiquiatricos

■ Otros

RESULTADOS


- N: 25 (34 pacientes seleccionados, 9 excluidos)
- Causas de disfagia
- Mediana edad: 9 años (RIQ 7,9-12)
- Sexo
- Antecedentes personales
- Pruebas complementarias

Pruebas complementarias (42%)



RESULTADOS

- N: 25 (34 pacientes seleccionados, 9 excluidos)
- Causas de disfagia
- Mediana edad: 9 años (RIQ 7,9-12)
- Sexo
- Antecedentes personales
- Pruebas complementarias
- Tratamiento



CONCLUSIONES

- En los pacientes dados de alta del Servicio de Urgencias con diagnóstico de disfagia sin una causa específica el diagnóstico final más frecuente es la disfagia fóbica. La mayoría de ellos son niños sanos en edad escolar sin antecedentes psiquiátricos.

LIMITACIONES

- Escaso número de pacientes.
- Información incompleta para el estudio en las historias clínicas revisadas.