

BRONQUIOLITIS. ¿QUÉ HAN ENTENDIDO LOS PADRES?

B. De Pazos, L. Beas, A. Lemonche, B. Espinosa, L. Baron, R.M. Calderón



Hospital Universitario
12 de Octubre

INTRODUCCIÓN

- Enfermedad prevalente. Motivo de consulta frecuente en SUP.
- No tratamiento específico. Papel importante de los cuidados domiciliarios
- Estudiar la calidad comunicación, comprensión del tratamiento domiciliario y signos de alarma.
- Describir tasa de reconsultas y reingresos

MATERIALES Y MÉTODOS

- Encuesta realizada (al alta) a cuidadores en el SUP tras explicar pronóstico, tratamiento y signos de alarma.

EDAD					
PERSONA ENTREVISTADA	Madre	Padre	Abuelos	Otro cuidador:	
ENF. MEDICAS	No refiere	Cardiópata	Enf. respiratoria	RNPT	Enf. neurológica
CIRUGIAS PREVIAS	No refiere	Sí:			


¿Qué tratamiento precisa no farmacológico?	Ninguno
	Medidas posturales (elevar el cabecero)
	Lavados nasales
	Comidas más frecuentes y cortas
	Evitar exposición al humo del tabaco
¿Qué tratamiento farmacológico precisa?	Paracetamol o ibuprofeno si fiebre >38°C
	Antibióticos
	Salbutamol??
¿Por qué motivos volvería a urgencias?	Dificultad respiratoria
	Rechazo de las tomas
	Mal estado general
	Aparición de fiebre o su persistencia

¿Qué considera dificultad respiratoria?	Apneas
	Tiraje, disociación <u>toraco</u> -abdominal
	Taquipnea
	Incremento de los mocos
¿Qué pronóstico tiene la bronquiolitis?	Inicio de la remisión en torno a 1 semana
	No hay secuelas relevantes a largo plazo
	Es una enfermedad potencialmente grave que es importante vigilar


RESULTADOS

- 30 encuestas (Noviembre-Diciembre 2017)
- Población:
 - ✓ Mediana edad **5 meses** (0,5-18).
 - ✓ **84,5%** contestado por madre.
 - ✓ No AP de interés.
 - ✓ El **43%** había acudido a su pediatra.
 - ✓ El **28%** había acudido a SUP con anterioridad.

RESULTADOS



RESULTADOS



- 3% de los encuestados identifica de forma correcta TODOS los síntomas de alarma.
- Un 28% identifica al menos 3

- Un 34% reconsultan.
- De estos un 64% ingresan en planta de hospitalización

CONCLUSIONES

- Importancia de la comprensión del tratamiento y datos de alarma en el manejo ambulatorio de la bronquiolitis.
 - Detección precoz del empeoramiento en domicilio.
 - Disminución de las visitas innecesarias en SUP.