

# ENCUESTA SOBRE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA

## Grupo de Analgesia y Sedación SEUP

Cuadrado Piqueras L<sup>1</sup>, Baquedano Lobera I<sup>1</sup>, Jimenez Olmos A<sup>1</sup>, Campos Calleja C<sup>1</sup>, Gómez Barrera V<sup>1</sup>, Sancho Gracia E<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Hospital Universitario Miguel Servet. <sup>2</sup>Hospital General San Jorge.

# OBJETIVO

Analizar la formación y práctica habitual en sedoanalgesia de los profesionales que trabajan en urgencias pediátricas.

# METODOLOGÍA

- Estudio multicéntrico, descriptivo, transversal
- Encuesta electrónica → profesionales que trabajan en urgencias pediátricas.
- Octubre 2017 - enero 2018.

**ENCUESTA A PROFESIONALES  
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE  
ANALGESIA Y SEDACIÓN**

En los últimos años, la realización de procedimientos de sedoanalgesia se ha convertido en algo habitual en los servicios de urgencias pediátricos, siendo el manejo del dolor y la ansiedad una prioridad en la actualidad.

Desde el Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría queremos, a través de esta encuesta, conocer la realidad de los diferentes servicios de urgencias en la actualidad. Se trata de un cuestionario individual, por ello queremos solicitar tu participación siendo muy importante que tus respuestas reflejen de forma real y sincera tu práctica habitual en urgencias.

Toda la información obtenida será tratada de manera confidencial y anónima. Los datos serán tratados siempre de manera grupal y no aparecerán datos individuales en ningún informe de esta investigación.

Muchas gracias por tu colaboración.

**SIGUIENTE** Página 1 de 21

Nunca envíe contraseñas a través de Formularios de Google.


Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Informar sobre abusos](#) - [Condiciones del servicio](#) - [Otros términos](#)

# RESULTADOS


176 cuestionarios

49 hospitales

17 CCAA




- MIR
- Adjuntos urgencias
- Ajuntos otras especialidades
- Enfermeros



# RESULTADOS: FORMACIÓN


- 96.6% consideran necesaria formación específica en sedoanalgesia.
- 63.8% refieren haber realizado algún curso.

Formación según categorías




# RESULTADOS: FORMACIÓN

## Socios de SEUP




Ser socio de SEUP es un factor favorecedor para recibir formación.  
(OR 2.3, IC 95%, IC 1.23-4.40)


## Conocen el manual de sedoanalgesia SEUP



## Conocen el Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación




# VALORACIÓN DEL DOLOR




# VALORACIÓN DEL DOLOR

## Empleo de escalas






# VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD



# TRATAMIENTO DEL DOLOR


## Prescripción de analgesia ajustada al grado de dolor



Más frecuente en los grupos que aplican escalas.


# TRATAMIENTO DEL DOLOR

## Prescripción analgesia




# TRATAMIENTO DEL DOLOR

## Tratamiento del dolor




## Fármacos más usados para el dolor moderado




# TRATAMIENTO DEL DOLOR

## Prescripción de opioides



Refieren utilizar anestésicos tópicos de forma frecuente, como coanalgésicos, 57.8%.

No utilizan nunca la vía intranasal 30.4%.



# CONCLUSIONES

1. Un elevado porcentaje de profesionales refiere valorar el dolor y prescribir analgesia según el grado del mismo, sobretodo pediatras de urgencias; siendo la valoración de la ansiedad un aspecto claramente a mejorar.
2. No vemos diferencias entre el tipo de opioide utilizado en dolor intenso y destaca la escasa utilización de la vía intranasal.
3. Resulta fundamental seguir fomentando la formación y actualización continua en sedoanalgesia entre el personal que trabaja en urgencias.