

# LACTANTE CON MILIARIA: DIAGNÓSTICO FINAL SARNA NODULAR

María Rosa Meléndez Gispert, Andrea Gutiérrez Camus, Patricia Bote Gascón, Julia Martín Sánchez, Marta Bueno Barriocanal, María de Ceano-Vivas la Calle.

Servicio de Urgencias Pediátricas, Hospital Universitario La Paz, Madrid



## INTRODUCCIÓN

- **Sarna nodular:** variante poco frecuente (7-10%), lactantes por hiperreactividad a productos del parásito.
- **Clínica:** **nódulos marronáceos-rojizos** pruriginosos, en axilas, ingles y región periumbilical.
- **Diagnóstico:** clínico
- **Tratamiento:** de elección **corticoides tópicos** o intralesionales, **antihistamínicos**, **preparados con alquitrán** y/o corticoides orales en ciclo corto.
- **Evolución:** resolución espontánea, aunque **puede persistir tras tratamiento** adecuado.

## CONCLUSIÓN

- La sarna en ocasiones es difícil de diagnosticar por el **amplio espectro de presentación clínica**, confundiéndose con otras patologías frecuentes en pediatría.
- La **sarna nodular** puede coexistir con la sarna clásica activa, y no responde al tratamiento escabicida.
- Es necesario una anamnesis exhaustiva a los familiares para llegar a diagnóstico y tratamiento precoces y así evitar reinfección.

## CASO CLÍNICO

Lactante de 1 mes con lesiones cutáneas de 1 semana de evolución, que en los últimos 2 días son costrosas. Afebril.

**EF:** pápulas eritematosas y perladas milimétricas con alguna costrosa y pseudopústulas en tronco, extremidades, cuello y región mentoniana.

**Diagnóstico:** miliaria.

**Tratamiento:** betametasona-ácido fusídico tópica / 12h hasta mejoría.

7  
DÍAS

Reconsulta por persistencia de lesiones cutáneas sin mejoría. Tras anamnesis, la madre refiere tener prurito generalizado y lesiones costrosas similares en antebrazo. Permanece afebril.

**EF:** exantema maculopapular con predominio de nódulos costrosos de 1cm en región torácica derecha, y micropápulas blanquecinas de 0,2 cm en tronco, con alguna aislada en brazo y mejilla derechos. (Fig. 1 y 2).

**Diagnóstico:** sarna nodular + Sarna clásica activa.

**Tto:** permetrina crema al 5% + Metilprednisolona aceponato tópica.



Fig. 1



Fig. 2