

DISPLASIA FIBROSA ÓSEA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON PATOLOGÍA MALIGNA

P. Aguiar Jar, B. Salamanca Zarzuela, M. Andrés de Álvaro, P. Bolívar Ruiz
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid

Múltiples causas de lesiones óseas: la mayoría patología **benigna**.

Debut: **DOLOR**, tumefacción, fractura, impotencia funcional, hallazgo radiológico...

CASO CLÍNICO

- ♂ 10 años. **Gonalgia pretibial** derecha 5 días de evolución.
- No antecedente traumático.
 - Clínica con **movimiento**.
 - Afebril, **no síntomas constitucionales**.
 - EF: TEP normal. No deformidad, no alteraciones cutáneas. No restricción funcional.



**GONALGIA INESPECÍFICA
+ DISPLASIA FIBROSA
ÓSEA HALLAZGO CASUAL**

RADIOGRAFÍA

CORTICAL	Adelgazada
PERIOSTIO	Normal
PARTES BLANDAS	Normal
DENSIDAD	Geográfico
MATRIZ	Fibrosa
LOCALIZACIÓN	Diáfisis
MULTIPLICIDAD	Única

BENIGNA

CONCLUSIÓN

Relacionar imagen con clínica y exploración.
Diferenciar patrones radiográficos benignidad y malignidad.

Tratamiento conservador.

Valoración TC.

Cirugía si progresa/inestabilidad.