

PILOMATRICOMA ANETODÉRMICO

Isabel Zárata Tejero¹, Javier Sánchez Bernal², Alba Hueto Najarro¹, Clara Laliena Oliva¹, Jose Mario Romero de Avila Montoya¹, Angela Ascaso Matamala¹

1. Pediatría HCU Lozano Blesa, Zaragoza. 2. Dermatología HCU Lozano Blesa, Zaragoza

INTRODUCCIÓN: El pilomatricoma es un **tumor benigno**, originado en las células matriciales del **folículo piloso**, que aparece frecuentemente durante la infancia en forma de nódulo duro y solitario.

CASO CLÍNICO

Varón 13 años, sin antecedentes de interés, derivado a urgencias por su pediatra por lesión cutánea de un mes de evolución de **rápido crecimiento** pese a tratamiento antibiótico. No otra clínica asociada. A la exploración, en región escapular derecha, **lesión excrecente nodular** de 1 cm, de consistencia **dura**, no adherida a planos profundos, cubierta por piel **atrófica**, eritematosa, con teleangiectasias, de aspecto queloideo. Se procede a exéresis de lesión en urgencias y se remite muestra a estudio, con resultado de pilomatricoma anetodérmico, sin recidiva ni incidencias hasta el momento actual.



Figura 1. Lesión tumoral de aspecto queloideo y detalle dermatoscópico donde apreciamos piel eritematosa atrófica, con vasos arboriformes y zonas anaranjadas-blanquecinas

CONCLUSIONES

El pilomatricoma anetodérmico es una variante poco frecuente de pilomatricoma caracterizada por presentarse clínicamente como un **nódulo de consistencia dura cubierto por una piel atrófica y plegada, con aspecto queloideo**. Es importante conocer el diagnóstico y manejo de esta entidad, ya que es frecuente en la infancia y el rápido crecimiento de esta variante puede dar lugar a tratamientos innecesarios y genera ansiedad en la familia y el pediatra.