

¿PODRÍA HABERSE EVITADO?: POLITRAUMATISMO EN PEDIATRÍA.

La **lesión traumática** es consecuencia de una o varias **fuerzas externas**; accidentales o intencionadas; que **superan** el umbral de **tolerabilidad** del individuo.

Principal **causa de muerte** desde el primer año de vida hasta la edad adulta.

Asocia un riesgo **importante de discapacidad**.

- El **mejor y más económico tratamiento** es la **prevención** tanto primaria como secundaria.
- Requerirá **educación sociosanitaria** y entrenamiento mínimo en **tratamiento inicial**; fundamental para evitar morbilidad posterior.

Paciente de **6 años** que, jugando en un **centro comercial**, tropieza y **cae** de frente **contra un expositor** de una tienda. Éste constaba de un **soporte vertical** central del que dependían numerosas **barras de hierro** horizontales perpendiculares.

Uno de los dispositivos de hierro **que queda alojado en cavidad oral**.

Sangrado profuso → servicio de emergencias → consciente → **inmovilización craneal**. → **Radiografía** → Cuerpo extraño cavidad oral y parece intracraneal → **TAC urgente**

No sangrado intra ni extraxial, no alteración intracavitaria. Varilla metálica atravesando músculo masetero y glándula parótida. Afectación limitada a partes blandas → extirpación bajo anestesia general por cirugía maxilo-facial.

Alta a las 24 horas antibiótico y analgésico domiciliario, y buena evolución posterior.

SITGES 19-21 de abril 2018

23 REUNIÓN ANUAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA