

ANAFILAXIA, ¿UNA PATOLOGÍA EN AUMENTO?

E. Torcuato Rubio, S. Torrejón Almeida, E. Godoy-Molina, A. Prieto del Prado, E. García Requena, S. Oliva Rodríguez-Pastor
Hospital Regional Universitario de Málaga

INTRODUCCIÓN


La anafilaxia es uno de los síndromes clínicos agudos más graves en pediatría. Se ha descrito un aumento de incidencia ligada, principalmente, a alérgenos alimentarios, siendo de vital importancia su reconocimiento e instauración precoz de tratamiento para evitar complicaciones.

OBJETIVO

Analizar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes diagnosticados de anafilaxia que acuden al servicio de Urgencias de nuestro hospital.


METODOLOGÍA

Se realiza estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de anafilaxia en un hospital de tercer nivel desde Enero de 2015 a Diciembre de 2017. Se recogieron variables epidemiológicas, clínicas y terapéuticas.



RESULTADOS


Clínica



Al alta

- Derivación a Alergología: 88,2% de los no alérgicos conocidos.
- Prescripción adrenalina: 42,4% del total

Tratamiento



CONCLUSIONES

- Se observa un infradiagnóstico de anafilaxia en ausencia de síntomas cutáneos.
- Se objetiva un infratratamiento domiciliario con adrenalina, a pesar de ser el tratamiento de primera línea, por lo que debemos incidir en la educación de los padres en la importancia de la instauración precoz de dicho tratamiento en domicilio.
- Se debe aumentar el número de prescripciones de adrenalina im al alta.

SITGES 19-21 de abril 2018