

SOSPECHA DE INTOXICACIÓN: ESTUDIO RETROSPECTIVO EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL SECUNDARIO

C. Toledo Gotor, C. García Muro, A. Ibiricu Lecumberri, E. Portal Gil, A. Olloqui Escalona, A. García Oguiza. Servicio de Pediatría, Hospital San Pedro, Logroño.

Introducción:


- ▶ Estudio observacional descriptivo y retrospectivo.
- ▶ Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018 (4 años).
- ▶ Área de Urgencias del Hospital San Pedro (Logroño).

Resultados:


- ▶ 238 consultas por CONTACTO ACCIDENTAL con SUSTANCIA TÓXICA.
- ▶ 0.3% de las Urgencias atendidas en menores de 14 años en nuestro hospital.

Resultados:


DISTRIBUCIÓN POR SEXOS



DISTRIBUCIÓN POR HORARIO DE CONSULTA




DISTRIBUCIÓN POR EDAD




Resultados:

TIPO DE PRODUCTO TÓXICO



Resultados:


REALIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



DESTINO AL ALTA DE URGENCIAS



TRATAMIENTO ADMINISTRADO



Resultados:

- ▶ Mecanismo de intoxicación más frecuente: **INGESTA INVOLUNTARIA.**
- ▶ En mayores de 12 años: **INGESTA VOLUNTARIA** (consumo recreacional de etanol).
- ▶ 3.8 % se consideró **INTENTO AUTOLÍTICO.**
- ▶ No se detectó ningún caso con intencionalidad homicida o maltrato infantil.

Conclusiones:

- ▶ En la mayoría de los casos, el contacto accidental se produjo con **sustancias o dosis no tóxicas**, por lo que fue minoritaria la necesidad de tratamiento específico.

Conclusiones:

- ▶ Destacan fundamentalmente dos grupos de edad: **menores de 5 años** (ingesta no voluntaria de fármacos o productos del hogar) y **adolescentes** tras consumo recreativo o intencionalidad suicida.