



SEUP
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA



**XXIV REUNIÓN**
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

UTILIDAD DEL ANÁLISIS DE ORINA PARA EL ABORDAJE DE LACTANTES QUE CONSULTAN POR IRRITABILIDAD SIN FIEBRE Y CON TEP ESTABLE EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA

Higelmo Gómez H, Míguez Martín M, Rodríguez Fernández S, Álvarez Álvarez A, González Acero A, Fernández Álvarez R. Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón

Declaramos no tener ningún conflicto de intereses

OBJETIVOS

- Evaluar la necesidad de realizar un análisis de orina en lactantes que consultan por irritabilidad, sin fiebre y con TEP estable en el servicio de Urgencias de Pediatría

METODOLOGÍA

- **Estudio descriptivo, retrospectivo**, durante 2016 y 2017
- **Criterios de inclusión:** lactantes 30 días – 6 meses que consultan por IRRITABILIDAD en Urgencias de Pediatría
- **Criterios de exclusión:** fiebre, TEP alterado, patología nefrourológica previa
- **Variables recogidas:** sexo, edad, antecedentes patológicos, clínica acompañante, análisis de orina, urocultivo, diagnóstico, destino al alta y reconsulta

RESULTADOS

- 101 pacientes (0.34% de las consultas)
- 53% mujeres
- Edad media 2.4 meses (DE 2.88)
- Clínica acompañante:
 1. Rinorrea y/o tos leve
 2. Rechazo de las tomas
 3. Regurgitaciones y/o vómitos esporádicos

RESULTADOS

- 71 análisis de orina (70%)
- 7 urocultivos (técnica estéril 100%)
- **1 único resultado positivo (*E. coli*)**
- Diagnósticos: “irritabilidad a observación”, “ausencia de patología aguda” y “cólicos” (79%)
- 96% alta a su domicilio
- 2 reconsultas dadas de alta como: “probable hidrocele” y “exantema vírico”

CONCLUSIONES

- Un solo caso de infección de orina (0.99% de las consultas por irritabilidad)
- Dada su baja rentabilidad y gasto de tiempo y recursos, la realización de un análisis de orina de rutina en el abordaje del lactante con irritabilidad, sin fiebre, TEP estable y ausencia de factores predisponentes, podría no ser necesario
- Limitaciones: estudio retrospectivo, muestra pequeña
- Deberían llevarse a cabo más estudios para realizar recomendaciones más firmes

MUCHAS GRACIAS

