

Manejo del asma en Urgencias de Pediatría. Análisis a los dos años de una intervención.

R. García Uzquiano, A. Armenteros Cañibano, A. Lasa Aranzasti, M. Letona Luqui, I. Olaciregui Echenique, C. Calvo Monge. Urgencias de Pediatría. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Donostia. San Sebastián. Guipúzcoa.

Introducción y Objetivos

- Ciertas deficiencias en nuestro servicio de UP.
- Gran variabilidad en el abordaje entre los profesionales.
- No se alcanzan los estándares para algunos indicadores de calidad.
- Se recomiendan medidas para mejorar tal situación.



Introducción y Objetivos

Analizar la eficacia a los dos años de la **instauración de un nuevo protocolo** en el que se enfatiza la importancia del **registro de la gravedad** de la crisis y en **empleo de terapia inhalada en crisis moderadas**.

2016

Intervención

2017

2018

Metodología

**Estudio descriptivo,
retrospectivo**

**Variables epidemiológicas,
clínicas, terapéuticas**

**Revisión de historias
clínicas**








**Microsoft Access,
paquete estadístico JASP**

**Octubre 2016, 2017 y
2018**


Estadístico Ji Cuadrado

**Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico de
asma, sibilancias y/o broncoespasmo atendidos en UP
(menores de 14 años)**

Resultados

	2016	2017	2018
	180	224	216
	39,2%/60,8%	34,4%/65,6%	43,6%/56,4%
	65,5%	74,2%	71,7%
 p < 0,05	75,6%	85,2%	82,3%
	91,7%	93,3%	93,9%
	100%	99,1%	100%
 p < 0,05 MOD.	15,6%	↑ 63,9%	↓ 53%

Resultados



Conclusiones

- La intervención formativa ha resultado eficaz a los dos años de impartirse en cuanto al mayor registro del PS y al empleo de inhaladores en crisis moderadas.
- Se objetiva un empeoramiento conforme transcurre el tiempo.
- Es necesario que se realicen intervenciones de forma frecuente para que la calidad asistencial no decrezca a largo de los años.