

Llanto o irritabilidad sin fiebre en menores de 3 meses en urgencias pediátricas

S. García-Prieto Sánchez, A. Martínez Alemán, A. Ruiz García, M. Rupérez Lucas, M. Martínez Campos, J.C. Rivas Crespo

Servicio de Pediatría.

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

INTRODUCCIÓN

- Llanto lactantes (<3 meses)
- Consulta muy común en Urgencias
- Causa orgánica subyacente poco frecuente

OBJETIVO:

Analizar las causas de **llanto sin fiebre** en menores de 3 meses que acuden a Urgencias en nuestro hospital

METODOLOGÍA

- **Estudio:** descriptivo retrospectivo
- **Población:**
 - Menores 3 meses
 - Llanto o irritabilidad
- **Período:** septiembre 2016 - septiembre 2018
- **Criterio de exclusión:** fiebre

Variables analizadas

Sexo	Diagnóstico
Edad	Pruebas complementarias
Antecedentes personales	Tratamiento
Hora de llegada	Ingreso
Tiempo de llanto	Derivación a especialista


RESULTADOS

N = 253


**Incidencia
llanto 12%**

253 / 2.100

SEXO



EDAD




Edad media: 30 días

RESULTADOS

➔ Duración del llanto

- < 8 días ➔ llanto < 6 h (56,6 %)
- A mayor edad, mayor tiempo de evolución



RESULTADOS


➔ Franja horaria

- < 8 días ➔ madrugada (60,4 %)
- Madrugada ➔ llanto < 6 h (56,3%)




RESULTADOS

➔ Pruebas complementarias



RESULTADOS

Diagnóstico




- Cólicos del lactante cumplen criterios Wessel → 1%
- < 8 días → escasa ingesta (52,8%)
- Dolor abdominal más frecuentes tarde
- Escasa ingesta de madrugada

RESULTADOS

➔ Intervención en urgencias


- Alta inmediata: 56.5%
- **Estancia media:** 1.5 horas



RESULTADOS

➔ Tratamiento y destino

- Sin tratamiento 61,7%
- **Ingreso** ➔ 1 paciente
- **Derivación especialista** ➔ 3 pacientes (1.2%)



CONCLUSIONES

- ▶ Llanto consulta muy frecuente
- ▶ Ansiedad paterna → atención precoz y madrugada
- ▶ Detectar signos de alarma
- ▶ Escasa necesidad pruebas ni tratamiento farmacológico
- ▶ Importancia alimentación recién nacidos
- ▶ Mayor precisión diagnóstico cólicos lactante

MUCHAS GRACIAS



MURCIA, MAYO 2019