

LAS CRISIS DE ANSIEDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS

López Nieves, MJ ; Jiménez Sahuquillo, A; Martínez Esparcia, M ;
Manzanero Maqueda, MC ; Cerdán Oncala, S; Sanz Zafrilla, E.
Servicio de Pediatría, Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete


Introducción

- ❖ Diagnóstico psiquiátrico **más frecuente** en la edad pediátrica.
- ❖ Prevalencia de entre un **3% y un 21%**.
- ❖ **Variabilidad de la sintomatología.**
- ❖ Dificultad en la anamnesis.
- ❖ **Infradiagnóstico.**

Objetivos



Describir los síntomas de los niños atendidos por crisis de ansiedad.




Analizar el manejo realizado en el servicio de urgencias pediátricas.

Metodología

- ❖ **Estudio descriptivo retrospectivo** de los pacientes **menores de 13 años** atendidos en el servicio de urgencias con diagnóstico de crisis de ansiedad, entre **enero de 2018 y enero de 2019.**

Resultados


❖ 22 casos




Media de edad	10,7 años
Edad mínima	6 años
Edad máxima	13 años

Resultados


Número de casos por mes



Numero casos por hora




Resultados




Resultados

Síntomas




Resultados

REALIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS




ECG	11
Glucemia capilar	4
Hemograma	2
Bioquímica	2
Gasometría ven.	1
TAC	1
Tóxicos orina	1
Rx Tórax	1



Resultados


❖ Tratamiento en urgencias: 36%





Resultados

Al alta:

❖ 50% derivados a USMIJ.



❖ 50% no se derivan a USMIJ.



Conclusiones

- ❖ No predominio de ninguno sexos.
- ❖ Diferencia en cuanto a la franja horaria.
- ❖ Heterogeneidad síntomas
- ❖ A pesar de tratarse de un diagnóstico clínico en más del 50% se solicitaron pruebas complementarias.