


EL PACIENTE AUTISTA EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA

- **SARA DE LA MATA NAVAZO**
- LUCÍA SANJUÁN BENITA
- ANA PEÑA MORENO
- PATRICIA PASCUAL GARCÍA
- BLANCA COLLADO GONZÁLEZ
- RAFAEL MARAÑÓN PARDILLO



LOS AUTORES DECLARAN NO
TENER CONFLICTO DE
INTERESES

INTRODUCCIÓN

PACIENTES CON TEA:

- Dificultades para la interacción social.
- Problemas para comunicación y expresión de síntomas.

Manejo
clínico difícil

Escasos estudios sobre pacientes con TEA en urgencias → EEUU y Canadá: PREVALENCIA 0,2%.

España: no bibliografía.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS:

- Estudio de **prevalencia** y **epidemiología** de visitas a urgencias de los pacientes con TEA.
- **Descripción** de los motivos de consulta y diagnósticos al alta por los que acuden a urgencias.
- **Concordancia** entre motivos de consulta y diagnósticos al alta.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de **prevalencia retrospectivo** en S. Urgencias pediátricas de un hospital terciario.

- < 16 años.
- Diagnóstico previo de TEA.
- Marzo-octubre 2018.

Análisis estadístico: descriptivo, Chi-Cuadrado, U de Mann-Whitney, índice kappa.

RESULTADOS

175 VISITAS A
URGENCIAS



99 PACIENTES

**PREVALENCIA: 0,61% DE
VISITAS A URGENCIAS
(IC95%:0,52-0,70%)**


- 85% **VARONES**.
- MEDIANA DE EDAD: **7,8 AÑOS** (IQI: 4,1-11,5).
- MEDIANA DE **2 VISITAS** POR PACIENTE.
- 33% CONSULTA > **1 OCASIÓN**.
- 50% TEA **LEVE**.

RESULTADOS

ATENCIÓN EN URGENCIAS:


- 19% REQUIRIERON OBSERVACIÓN/
TRATAMIENTO.
- 13,7% RECONSULTARON EN LAS SIGUIENTES 72h.
- 5,7% INGRESARON.

RESULTADOS



RESULTADOS

DIAGNÓSTICO AL ALTA



RESULTADOS

77% ADECUADA CORRELACIÓN
MOTIVO DE CONSULTA –
DIAGNÓSTICO AL ALTA (Kappa=0,75)

NO ASOCIACIÓN
CON GRADO DE TEA
(p=0,448)

NO ASOCIACIÓN CON
AÑOS DESDE EL
DIAGNÓSTICO (p=0,457)

LIMITACIONES

AMITEA: Atención Médica Integral de los pacientes con Trastorno del Espectro Autista



Posible sobreestimación de la incidencia.

CONCLUSIONES

- Los niños con TEA acuden a urgencias por **motivos similares** a niños no autistas.
- Un **bajo porcentaje** de sus visitas a urgencias son de **índole psiquiátrica**.
- Los padres de los niños con TEA son **capaces de valorar sus síntomas adecuadamente**.

