Osakidetza

DONOSTIALDEA ESI
OSI DONOSTIALDEA

XXIV REUNIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

EL FACTOR CONFUSION EN LAS INTOXICACIONES PEDIATRICAS

Muñoz Bernal MI, Urgel Muñoz P, Elorza Berra MC,
Muñoz Bernal JA, Landa Maya JJ.

Introducción

Las formas más frecuentes de intoxicación son la ingesta accidental en menores de 5 años

y las ingestas voluntarias en mayores de 10 años.

Objetivo

Analizar las características de las intoxicaciones pediátricas asociadas al factor confusión.

¿FACTOR CONFUSION?

Error en la dosificación y/o administración de fármacos o productos.

Metodología y resultados

MECANISMO



GRUPO ETARIO



n

TOXICO

Metodología y resultados

1103

87(7,9%)



Metodología y resultados

GRUPO ETARIO



Metodología y resultados



Metodología y resultados



Metodología y resultados



Conclusiones



Las intoxicaciones por confusión se producen mayoritariamente por errores en la dosificación de fármacos, siendo el principal agente causal los antitérmicos y dentro de éstos el paracetamol.

Más frecuentes en el primer año de vida.

Educación sanitaria a padres o cuidadores para la prevención.

Eskerrik asko. Muchas gracias.