


MANEJO DEL SÍNDROME DE INTESTINO CORTO EN URGENCIAS

Buceta Cuéllar L, Bautista Barea M, Alcolea Sánchez A, López López R, García Sánchez P, De Ceano-Vivas La Calle M.

Servicio Urgencias Pediátricas Hospital Infantil Universitario La Paz



DEFINICIÓN



El **fracaso intestinal** se define como la **reducción de la masa intestinal funcional** por debajo de la cantidad mínima necesaria para la digestión y la absorción adecuada de nutrientes y fluidos, que **requiere el uso de terapia intravenosa**.


ETIOLOGÍA



El **síndrome de intestino corto (SIC)** es la **causa más frecuente** de fracaso intestinal en el niño.

AUTÓNOMO

**No necesita
nutrición parenteral**



OBJETIVOS

Motivos de consulta

Pruebas complementarias

Porcentaje de ingresos

Recursos que precisan

Protocolo específico


INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS


METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES




METODOLOGÍA




Estudio **observacional retrospectivo** de los pacientes con SIC atendidos en Urgencias Pediátricas de un hospital terciario **entre enero 2015 y diciembre 2018**.

Historias clínicas de pacientes de **edades comprendidas entre 1 mes y 18 años**.
Analizamos **274 visitas a Urgencias de 57 niños con SIC**.


ETIOLOGÍA




Nº VISITAS




SEXO




ESTANCIA MEDIA







INGESTA




CVC




GASTROSTOMÍA y SNG







SÍNTOMAS




ANALÍTICA




HEMOCULTIVO




COPROCULTIVO







DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO



INGRESOS
46.7%



CONCLUSIONES




El SIC conlleva **descompensaciones frecuentes y numerosas visitas** a Urgencias.

En >50% de las visitas se realizaron **pruebas complementarias**, con una **estancia media larga** y un **elevado porcentaje de ingresos**, por lo que estos pacientes consumen gran cantidad de recursos en este servicio.

El conocimiento de los motivos de descompensación más frecuentes puede ayudar a la **elaboración de protocolos** para mejorar el manejo de estos pacientes.



Hospital Universitario
La Paz
Hospital Carlos III
Hospital Cantoblanco



XXIV REUNIÓN
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

¡GRACIAS!

