



# CONOCIMIENTOS DE LOS ADULTOS SOBRE LA GASTROENTERITIS AGUDA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA

M.Lorenzana; E. De Frutos; V. Ríos; A. Martínez; R. Capilla; S. García-Prieto.

*Servicio de Pediatría.*

*Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.*

MURCIA, MAYO 2019

# INTRODUCCIÓN

- **La gastroenteritis aguda (GEA):**
  - Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia.
  - Numerosas visitas al servicio de urgencias.
  - Falsos mitos.
- **Objetivo:** identificar el grado de creencia en los mismos por parte de los cuidadores con el fin de mejorar nuestra atención orientando la información hacia aquellos conocimientos erróneos o desconocidos.

1. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, Lo Vecchio A, Shamir R, Szajewska H; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; European Society for Pediatric Infectious Diseases. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jul;59(1):132-52.

2. Benítez Maestre AM, de Miguel Durán F. Gastroenteritis aguda. Pediatr Integral. 2015;XIX:51-7.

3. J. Costa i Pagès, I. Polanco Allué, C.R. Gonzalo de Liria Guía de Práctica Clínica. Gastroenteritis aguda en el niño. Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y Sociedad Española de Infectología Pediátrica Ergon, Madrid y Barcelona (2010)

# MÉTODOS Y RESULTADOS

**Descriptivo**

**Transversal**

Encuestas anónimas a  
adultos que acompañaban  
a los niños al SU por  
cualquier motivo de un  
hospital 2º nivel  
(nov 18)

**122 encuestados**


**Datos demográficos: 4 preg**  
**Encuesta conocimientos: 10 preg**




# DATOS DEMOGRÁFICOS

- 1. Edad media de los encuestados: **40,5 años.**
- 2. Edad media de los niños a los que acompañaban: **56 meses.**
- 3. Nacionalidad de los encuestados:
- 4. Motivo de consulta:

MOTIVO DE CONSULTA




NACIONALIDAD ENCUESTADOS




# ENCUESTA CONOCIMIENTOS

● VERDADERO  
● FALSO

- Causa principal **bacterias**.




- **Fiebre** otorga mayor gravedad.




# ENCUESTA CONOCIMIENTOS

● VERDADERO  
● FALSO

- Necesario uso de **antibióticos** para resolución.




- Necesaria **retirada de lactosa** desde el inicio.



# ENCUESTA CONOCIMIENTOS

● VERDADERO  
● FALSO

- Fundamental **dieta astringente** para resolución.







# ENCUESTA CONOCIMIENTOS

● VERDADERO  
● FALSO

- Necesaria analítica sanguínea para diagnóstico de **deshidratación**.
- Recomendable ofrecer **zumos** o bebidas tipo **aquarius/coca-cola** si predomina la diarrea.







# ENCUESTA CONOCIMIENTOS

● VERDADERO  
● FALSO


- Tras un vómito, es recomendable **reposo** **digestivo** durante 30-40 min.
- La **alimentación precoz** en una GEA acelera la curación.



# ENCUESTA CONOCIMIENTOS

● VERDADERO  
● FALSO

- Mejor forma de evitar el contagio es con el **lavado de manos**.



# CONCLUSIONES

- **CONTINUAR realizando intervención educativa**
  - Haciendo mayor hincapié en cuanto a la etiología y tratamiento.
  - Manejo más óptimo en el domicilio
    - **Disminuyendo complicaciones y las visitas al servicio de urgencias.**

# MUCHAS GRACIAS



MURCIA, MAYO 2019