


Comparación de la sedoanalgesia en Urgencias entre intensivistas pediátricos, pediatras generales y residentes

Fernández-Cantalejo Padiál J, Heras Sánchez E, Hernández García B, Medina Castillo ML, Francisco Torre R, Montes Arjona AM

Objetivo: Comparar la sedoanalgesia en pacientes atendidos en un servicio de Urgencias según el pediatra responsable

Método: Estudio prospectivo observacional en el que se incluyeron los niños atendidos en Urgencias que precisaron sedoanalgesia para la realización de alguna técnica entre septiembre 2013 y noviembre 2018

Técnicas




- Sutura heridas
- Reducción fracturas
- Extracción cuerpos extraños
- Drenajes abscesos
- Punción lumbar
- Otros

577 sedaciones

Efectividad sedaciones: 94%

Efectos adversos: 1.9% (todos leves)

Fármacos más empleados



Vías más utilizadas:

- Inhalada 64.6%
- Intravenosa 13.5%

SEDACIONES SEGÚN GRUPO:

INTENSIVISTA PED / PEDIATRA GENERAL / RESIDENTE PED

• **No diferencias significativas entre la satisfacción con la sedación** al preguntar al pediatra responsable, enfermeros ni familiares (91,7%, 94,3%, 95,5%)

• **No diferencias significativas en efectos adversos, tipo de fármaco, vía de administración ni estado físico de los pacientes**, casi todos sanos (99,8%)

CONCLUSIÓN

Para la realización de una sedoanalgesia efectiva y segura en Urgencias, no es necesario tener conocimientos específicos ni experiencia en Cuidados Intensivos pediátricos