

MANEJO DE LA ANALGESIA EN SERVICIO E URGENCIAS DE SEGUNDO NIVEL

Esther Llorente López, María García Barba, Enrique La Orden Izquierdo, Almudena Lagares Velasco, Miguel Gallardo Padilla, María Pérez Pascual.
H.U. Infanta Elena, Valdemoro, Madrid.



INTRODUCCIÓN

ESCENARIO ACTUAL:

- ❖ Dolor en el niño: síntoma subjetivo, de difícil gradación e infravalorado en los S.U.P.
- ❖ No protocolos específicos y validados en pediatría en la mayoría de centros.
- ❖ Un manejo correcto → mejor evolución clínica, disminución de estancia hospitalaria y aumento de la satisfacción general en la asistencia sanitaria.

OBJETIVO:

Revisar el manejo actual del dolor en el servicio de urgencias de nuestro centro con la finalidad de implantar medidas para su correcta evaluación y tratamiento.

RESULTADOS


EVA 4-5

EVA 6-10

	PED (n=51)	TRAUMA/CIRUGIA (n=53)	PEDIATRIA (n= 12)	TRAUMA/CIRUGIA (n=8)
RECIBE ANALGESIA	28 (54%)	9 (16%)	7 (58%)	4 (50%)
VIA ADMINISTRACIÓN	vo 21 iv 7	vo 8 iv 1	vo: 3 iv: 4	vo: 2 iv: 2
ESCALON OMS	E1: 28	E1: 7 E1+E3: 1 E3: 1	E1: 7	E1: 3 E3: 1
FÁRMACOS	Paracetamol: 1 Ibuprofeno: 11 Metamizol: 16 (57%)	Ibuprofeno: 6 (66%) Metamizol: 1 Fentanilo: 1 Ketamina: 1	Paracetamol: 1 Ibuprofeno: 1 Metamizol: 5 (71%)	Ibuprofeno: 2 (50%) Metamizol: 1 Fentanilo: 1
Tº ANALG	15 minutos	13 minutos	14 minutos	12 minutos
Tº ATENCIÓN	13 minutos	31 minutos	16 minutos	11 minutos


MATERIAL Y MÉTODOS

ESTUDIO RETROSPECTIVO DESCRIPTIVO




- ❖ Octubre - Diciembre 2018.
- ❖ Triage pediátrico: escala EVA del dolor, puntuación ≥ 4.
- ❖ Se excluyeron: aquellos con fiebre (posible factor de confusión).
- ❖ **N=124.** 61% niños (n=76) y 39% niñas (n=48).
- 63: atendidos por S. de Pediatría, y 61 por S. Qx/COT.

- ❖ 2 grupos →




- ❖ Variables estudiadas:
 - Tipo de analgesia según la escala de analgesia de la OMS.
 - Vía de administración.
 - Tº hasta administración de analgesia y hasta atención.

Fármacos EVA 6-10 PED



Fármacos EVA 6-10 COT/Qx



CONCLUSIONES

Se detecta un infratratamiento del dolor en el servicio de urgencias, **poca adecuación a los distintos escalones analgésicos**, lo que confirma la necesidad de revisión de protocolos específicos y formación del personal sanitario en éste ámbito.