

# INTOXICACIÓN POR MINOXIDIL

## INTRODUCCIÓN

El Minoxidil es un antialopéxico de uso tópico y venta libre, usado previamente como antihipertensivo por su efecto vasodilatador e hipotensor potente. Su absorción es muy rápida, alcanza el pico plasmático a la hora de su ingesta, limitando la descontaminación intestinal con carbón activado. Como efectos adversos en pediatría se conocen la hipotensión (prolongada), taquicardia, mareos, vómitos y eritema facial.



## CASO 1

Varón de 3 años, que ingiere 5 ml de Minoxidil tópico capilar al 5%. Inicialmente presenta rubefacción facial, manteniendo las constantes normales. Se administra carbón activado a su llegada. Posteriormente aparece taquicardia e hipotensión. Ingreso en planta 72 horas.

## CASO 2

Varón de 11 meses, que ingiere 5 ml de Minoxidil al 2%, presentando como único síntoma hipersudoración. Ingreso en observación durante 24 horas, presentando taquicardia mantenida y tensión arterial en límite normal para su edad.

Resolución espontánea  
sin tratamiento ionotrópico.

## CONCLUSIONES

- Sería relevante destacar los efectos secundarios en las preparaciones de minoxidil para uso tópico.
- El tratamiento de la intoxicación por minoxidil es sintomático, requiere una vigilancia estrecha en un medio hospitalario, ya que puede producir graves efectos a nivel cardiovascular en pacientes pediátricos.
- Nuestros pacientes no requirieron tratamiento específico.

