

# ¿ALERGIA O EXANTEMA VÍRICO?

Cabrerizo Ortiz M., Olivares Aguirre Sara, Sanavia Morán E., González Vives L., Muñoz Lozón A., Pérez-Moneo Agapito B.

**INTRODUCCIÓN:** Exantemas motivo frecuente de consulta. La coexistencia con la toma de antibiótico, sobre todo penicilinas, es relativamente frecuente, generando dudas sobre la etiología. Sin embargo sólo el 1-5% de la población es alérgica a estos antibióticos

**OBJETIVOS:** Estudiar la asociación entre la aparición de exantema cutáneo y la administración de antibiótico en los pacientes que consultan en un servicio de urgencias pediátricas

## MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo

Pacientes atendidos en un hospital de segundo nivel durante el 2018 que consultaban en el SU Pediátricas por exantema


Pacientes en los que coincidió con la ingesta de antibiótico en ese momento o en la última semana.

1348 exantema

112 antibiótico

82 (73.2 %) día de la consulta  
30 (26.8%) última semana

Media de edad: 40 meses



93.4% pacientes  
**AMOXICILINA**



•48 de los 82 pacientes que estaban tomando antibiótico este se suspendió

58.5%

48%

- En 23 se sustituyó por otro antibiótico
- AZITROMICINA (56.5%)

•42.9 % del total pacientes con exantema e ingesta de antibióticos fue derivado a consultas de alergia  
•Se confirmó alergia a antibióticos en 4

3.5%

## CONCLUSIONES:

Los antibióticos son una causa poco frecuente de exantema en pediatría

En nuestro servicio el manejo de estos pacientes en cuanto suspensión del fármaco, sustitución por otro antibiótico o derivación para estudio en consultas de Alergia es muy variable, dependiendo del criterio de cada profesional.

Esta falta de unificación hace necesario crear un protocolo con criterios de actuación definidos en estos pacientes.