

AUTOPERCEPCIÓN Y EVALUACIÓN TEÓRICA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Soriano Marco A, Ciudad Aguilar L, Obieta Fernández A, De Carlos Vicente JC, López Corominas V, Ferrés Serrat F.
Hospital Universitario Son Espases, Palma

INTRODUCCIÓN


El personal sanitario que trabaja en los **servicios de urgencias pediátricos** debería **conocer su rol** y tener los **conocimientos** que permitan una actuación rápida y efectiva en el caso de una parada cardiorrespiratoria (PCR) en el paciente pediátrico, **Objetivo:** valorar la autopercepción y los conocimientos en reanimación cardiopulmonar (RCP) de dicho personal.

METODOLOGÍA

- Estudio **descriptivo** basado en una encuesta tipo test.
- **60 encuestas** distribuidas.
- Preguntas relativas a autopercepción en conocimientos y valoración teórica de conocimientos reales.
- **Limitación:** No realizada evaluación práctica.

RESULTADOS

RESPUESTAS OBTENIDAS (48)



- Médico adjunto (12)
- MIR de Pediatría (15)
- MIR MFYC (3)
- Enfermería (12)
- Auxiliar de enfermería (6)
- Otro (1)

GRADO DE FORMACIÓN

- **85,4%** RCP avanzada (RCP-A)
- **72,9%** RCP avanzada pediátrica (RCP-AP).
- **16,66%** nunca han realizado un curso de RCP pediátrica..
- **50%** ha realizado algún tipo de formación en el último año.
- El **91,6%** en los últimos 5 años.

ROL EN LA RCP

- El **66,66%** del total afirma conocer su rol.
- El **66,66%** de los MIR refiere no tenerlo claro (**grupo de mayor desconfianza**).

VALORACIÓN DE LA AUTOPERCEPCIÓN Y CONOCIMIENTOS

IDENTIFICACIÓN PCR


El **81,25%** de los encuestados cree que sabría identificarla.

La harían **correctamente**:

- El **86,66%** de médicos.
- El **27,27%** de enfermeros.

ALERTA AL EQUIPO DE PARO

¿Sabe cuándo y cómo?




VÍAS Y FÁRMACOS

El **43,9%** de los formados en RCP-A consideraría la vía intraósea como **vía de larga duración**.

SECUENCIA RCP


¿Cree estar preparado para su aplicación correcta?



Un **44,6%** NO la aplica correctamente en la evaluación.

MATERIAL DE EMERGENCIA

¿Conoce la disposición?



CUERPO EXTRAÑO VÍA AEREA

Un **34%** de los formados en RCP **no actuaría correctamente** ante un **paciente inconsciente** que ha sufrido un **atragantamiento**.

RITMOS CARDÍACOS

De **35** formados en RCP-AP:

- El **65,7%** NO se sienten preparados para desfibrilar.

VENTILACIÓN INSTRUMENTALIZADA MASAJE CARDÍACO

Menor **autoconfianza** en lactantes que en niños.

CESE RCP

18/30 médicos afirman saber cuándo detener una RCP.
12/18 (40%) lo harían correctamente.

CONCLUSIONES

- Se debería **exigir una formación en RCP adecuada** al personal que trabaja en Urgencias de Pediatría.
- Esta debería incluir **cursos periódicos y complementarse con sesiones de simulación** para **reafirmar conocimientos adquiridos y aumentar la autoconfianza**.