PRESENTACIONES DE LA ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO (EAG) EN URGENCIAS

XXIV REUNIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE URGENCIAS DE PEDIATRÍA
9 AL 11 DE MAYO DE 2019

Doménech Armisén, A; López Torres, S; Aguadé Borrull, D; Coma Muñoz, A; Melendo Pérez, S; González Peris, S

¿Qué es la EAG?

La infección por ***Bartonella henselae*** cursa con una lesión dérmica en la zona de inoculación que precede a **adenopatía** regional dolorosa y fiebre.

Hasta un **20%** de casos tiene presentación **atípica** con síndrome febril prolongado, adenopatías generalizadas o afectación multiorgánica.

El principal agente transmisor es el **gato**, aunque existen otros menos frecuentes

CONCLUSIONES

- Incluir la EAG en el diagnóstico diferencial de **adenopatía** regional **dolorosa** +/- **síndrome febril.**
- La clínica aparece 1-3 semanas tras la inoculación y puede persistir hasta más de 6 meses.
- Diagnóstico basado en sospecha clínica y serología. Valorar necesidad de biopsia para descartar malignidad.
- En pacientes inmunocompetentes, tiende a la **resolución espontánea.**
- Si evolución tórpida o **clínica atípica**, pueden beneficiarse de azitromicina.

	CASO 1	CASO 2
Clínica y exploración física	11 años Bultoma inguinal izquierdo 4x3cm de 3 semanas de evolución. No móvil, doloroso no signos flogóticos. Fiebre + cuadro catarral	10 años Bultoma 2x2cm doloroso anterosuperior a axila derecha de 2 días de evolución. No indurado. Afebril. Arañazos en abdomen y brazo
	Hemograma: Hb 11.3 g/dL, L 9.52*10E9 (5600 N, 3000 Lf) Bioquímica: PCR 0.0.6 mg/dL, VSG 72mm/h Serología: IgM e IgG positivas *B. henselae*	Hemograma: Hb 13.9 g/dL, L 6.82*10E9 (2000 N, 3200 Lf) Serología: IgG *B. Henselae* positiva, IgM negativa

Agente transmisor

Gatos y perros en domicilio





Evolución

Persistencia tras 15-20 días de tratamiento sintomático

Azitromicina vo 5 días

Reducción tamaño y dolor

Vall d'Hebron Barcelona Campus Hospitalari