

# "CUERPO EXTRAÑO ORL Y EL OTORRINO OTRA VEZ LOCALIZADO..."

Acuñas Soto S, Romero Castillo E, Morales Arandojo P, Jiménez Oyarzabal M, Hernández González A. UGC Pediatría. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

## INTRODUCCIÓN

Los CE en nariz y oído son un motivo de consulta frecuente en urgencias pediátricas. A menudo pueden ser manejados por el personal de urgencias sin riesgo significativo, pero en ocasiones es necesaria la intervención del ORL. Las consideraciones para su exitosa eliminación son multifactoriales.

## OBJETIVOS

Describir la población que acude a urgencias pediátricas por CE nasales y óticos, su manejo y el papel del ORL en su valoración y tratamiento

## MATERIAL Y MÉTODOS


- ❖ Estudio descriptivo transversal retrospectivo
- ❖ Revisamos las visitas a urgencias pediátricas de nuestro hospital por CE nasales y óticos durante 2017-2018

## RESULTADOS

- ❖ n=99
- ❖ edad media  $4.6 \pm 2.9$  años
- ❖ 56.6% niños
- ❖ 43.4% niñas
- ❖ alimentos (13)
- ❖ piezas de plástico (11)
- ❖ mat escolar (8)
- ❖ piedras (7)
- ❖ plastilina (7)
- ❖ joyas (7)
- ❖ juguetes (6)


Complicaciones en 8 pacientes → 1 grave (isquemia de mucosa y tabique nasal)

### Localización CE



■ Nariz ■ Oído

### ¿Quién extrae el CE?



■ Urg Ped ■ ORL diferido ■ ORL urgente

Los CE nasales fueron más comunes en < 4 años, mientras que los óticos predominaron en  $\geq 4$  años ( $p < 0,05$ )

Los CE óticos fueron extraídos con más frecuencia que los nasales por ORL (85% vs 45.5%,  $p < 0,05$ )

El grupo de mayor edad requirió más frecuentemente atención por ORL ( $p < 0,05$ )

## CONCLUSIONES

- ❖ Los CE son motivo de consulta frecuente en urgencias pediátricas, requiriendo interconsulta a ORL en múltiples ocasiones, con más frecuencia los CE óticos y en niños  $\geq 4$  años.
- ❖ Dado que no todos los centros disponen de otorrinolaringólogo de presencia física permanente, cuando no es posible la extracción por el personal de urgencias, debemos conocer muy bien cuándo ésta puede ser diferida o necesita realizarse de manera urgente, ya que, aunque las complicaciones son raras y generalmente leves, en ocasiones pueden revestir gravedad.