


XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

¡¡¡Pero hijo... ¿qué te has tomado?!!! Principales causas de intoxicaciones en pediatría

González López L, Martín Delgado Á, Maté Espeso A, Sendino González J. *Hospital Clínico Universitario. Valladolid.*



Introducción

- Una intoxicación aguda se define como cualquier exposición a una o varias sustancias que pueden ocasionar una lesión en el organismo.
- En pediatría representan el 0,3% de las consultas a urgencias, pero únicamente el 5-10% ocasionan procesos potencialmente graves.

Objetivos

- Conocer la incidencia de las intoxicaciones atendidas en el servicio de urgencias pediátricas de un hospital terciario durante el año 2018.
- Conocer las intervenciones enfermeras más frecuentes en el manejo de las intoxicaciones.



Metodología

- Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo.
- Se usó un registro de todas las urgencias que acudieron a la unidad de urgencias pediátricas, que atiende a pacientes de 0 a 13 años de edad, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
- Se analizaron exclusivamente aquellos motivos de consulta relacionados con intoxicaciones de diferente etiología, tanto farmacológicas como no farmacológicas, creando para ello una base de datos con el programa informático Excel.




Metodología

- La hoja de recogida de información fue tipo *ad hoc* y estaba anonimizada. En ella figuran los siguientes datos:
 - Motivo de consulta
 - Nivel de triaje.
 - Pruebas complementarias que se realizaron durante la atención hospitalaria.
 - Procedimientos de enfermería realizados.
 - Destino del paciente.



Resultados

Clasificación por nivel de prioridad



Intervenciones de enfermería durante la atención



Resultados

Etiología de las intoxicaciones



Conclusiones

- Las intoxicaciones farmacológicas fueron algo más numerosas que las no farmacológicas. Las más habituales fueron las causadas por el paracetamol y los productos de limpieza respectivamente.
- La mayoría de las intoxicaciones fueron de carácter leve y se dieron en niños varones en edad preescolar que finalmente fueron dados de alta domiciliaria.
- La intervención de enfermería más utilizada fue la administración de medicación, especialmente por vía oral.



**Muchas gracias
por su atención**