

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

Comunicación corta.

Minimizar
mejorar
Avanzar

Indicador de calidad: administración de corticoide oral en crisis asmáticas en la primera hora tras triaje.

Autores: Suárez, A; Espino, M; Reyes, A; Bordón E; Romero C; Hernández J.

Centro de trabajo: Servicio de Pediatría. Hospital Materno Infantil de Canarias. Las Palmas de GC

Introducción

- ➔ La **administración precoz de corticoides orales** en crisis asmáticas moderadas y graves mejora la evolución de la crisis.
- ➔ El porcentaje de pacientes tratados con **corticoide oral** en la primera hora a partir del triaje es considerado un **importante indicador de calidad**.
- ➔ Grupo de trabajo de calidad y seguridad clínica de la SEUP: el **porcentaje de pacientes tratados en la primera hora debería superar el 90%**.

Objetivos

- ➔ **Describir la situación de nuestro servicio** en cuanto a este marcador en el tratamiento de las crisis asmáticas moderadas y graves y **compararlo con el estándar marcado por la SEUP**.

Material y métodos

- ➔ Estudio **descriptivo retrospectivo**.
- ➔ Revisión de historias clínicas electrónicas de los pacientes que acudieron al **servicio de Urgencias** de nuestro centro **durante 2019** con diagnóstico de “**crisis asmática**” o “**crisis de sibilancias**” **moderada o grave**.
- ➔ Se determinó si se administraron **corticoides orales** en la primera hora tras el triaje.
- ➔ Se **excluyeron** aquellos pacientes que **fueron tratados previamente** en otro centro y posteriormente derivados o aquellos que habían sido **valorados y tratados** las 24 horas previas.
- ➔ Recogida de variables {
 - Datos **generales**: mes y hora de llegada al servicio.
 - Diagnóstico** de crisis asmática o de sibilancia moderada o grave.
 - Medidas terapéuticas**: Administración de corticoides, hora y vía de administración.

Resultados

- ➔ Durante el **año 2019** se atendieron en el servicio de urgencias de nuestro centro un total de **790 pacientes** con diagnóstico de **crisis asmática o crisis de sibilancias moderada o grave**.
- ➔ De estos, en la primera hora tras el triaje, **574** recibieron **corticoide oral** y **21** recibieron **corticoide parenteral**.


Por lo tanto, un **73%** de los pacientes recibieron **corticoide oral** en la primera hora y un **75%** recibieron **corticoide** por cualquier vía en la primera hora.




Resultados

Administración de corticoides.

Tipo de tratamiento corticoideo administrado



Proporción de tratamiento corticoideo en la 1ª hora



Conclusión

Dado que se considera estándar un porcentaje mayor al 90% según consenso de expertos, **en nuestro centro no se cumple dicho indicador.**

Es importante debido al **valor pronóstico** que supone.

Posibles **medidas de mejora** podrían ir dirigidas a reducir el tiempo de espera previo a la atención médica.

