

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Mejora de la calidad en la atención de la
anafilaxia en la Urgencia Pediátrica**

Aguar Pardilla P, Guillén Onandía I, González Sánchez A, Porto Abal R, Pérez García MJ.

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda.



Introducción

La anafilaxia es una urgencia vital con una incidencia en aumento. La Guía Galaxia de actuación en anafilaxia es una guía de consenso entre las sociedades de alergias y urgencias pediátricas y de adulto.

Objetivos

Valorar si nuestros informes de alta en la Unidad de Urgencias de pacientes con anafilaxia cumplen las recomendaciones de la Guía Galaxia e introducir posibles mejoras en la atención a nuestros pacientes.



Metodología

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los pacientes diagnosticados de anafilaxia durante el año 2018 en la Unidad de Urgencias. Total: 36 pacientes.

Se seleccionaron varios ítems recomendados en la Guía Galaxia que han de constar en el informe de alta de Urgencias de los pacientes con anafilaxia y se añadieron otros considerados también importantes.




Resultados

¿Ha sido incluido el ítem en el informe de alta?	SÍ	NO
Hora de la reacción	27 (75%)	9 (25%)
Signos y síntomas y secuencia temporal	33 (91.6%)	3 (8.3%)
Constantes:		
- Presión arterial	25 (69.4%)	11 (30.5%)
- Frecuencia cardiaca	33 (91.6%)	3 (8.3%)
- Frecuencia respiratoria	7 (19.4%)	29 (80.6%)
- Saturación O2	30 (83.3%)	6 (16.6%)
Exploración física:		
- Cutánea	34 (94.4%)	2 (5.5%)
- Respiratoria	36 (100%)	0 (0%)
- Cardiovascular	33 (91.6%)	3 (8.3%)
- Neurológica	23 (63.8%)	13 (36.1%)



Posible desencadenante	33 (91.6%)	3 (8.3%)
Lugar de la anafilaxia	7 (19.4%)	29 (80.6%)
Tratamiento precisado	36 (100%)	0 (0%)
¿Se he dejado reflejada la dosis de adrenalina? *	27 (75%)	9 (25%)
¿Ha sido correctas todas las dosis de adrenalina? *	21 (77.7%)	6 (22.2%)
Recomendaciones al alta: - Acudir de nuevo a Urgencias si se reinician los síntomas - Evitación de factores desencadenantes sospechados - Prescripción de dispositivo autoinyector de adrenalina (si indicado) - Dosis correcta de dispositivo autoinyector de adrenalina - Plan para la continuidad asistencial por parte de Atención Primaria	34 (100%) 20 (58.8%) 15 (48.2%) 8 (53.3%) 34 (100%)	0 (0%) 14 (41.1%) 14 (51.7%) 7 (46.6%) 0 (0%)
Alerta sanitaria *	10 (37%)	17 (62.9%)

* No incluidos en Guía Galaxia 2016



Conclusiones

Tras esta revisión se ha objetivado una calidad en la atención a estos pacientes no óptima, por lo que se ha decidido realizar intervenciones de mejora dentro del Servicio de Pediatría.

