


XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

TIPO PRESENTACIÓN: ORAL CORTA

Minimizar
mejorar
Avanzar

Manejo de la gastroenteritis aguda en Urgencias de Pediatría ¿Lo hacemos bien?

Autores: L.Pugès Bria, S. Bardají Pejenaute, J.A. Muñoz Bernal, I. Olaciregui Echenique, C. Calvo Monge, A. Cámara Otegui

Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Donostia. San Sebastián. Gipuzkoa.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

- En la deshidratación secundaria a gastroenteritis aguda (GEA) la **rehidratación oral (RO)** es el tratamiento de elección, al ser más **fisiológica, económica y conseguir antes la tolerancia a la alimentación.**
- La **rehidratación intravenosa (RIV)** se reserva para la deshidratación grave o cuando fracasa la RO.
- Objetivo de este trabajo: comprobar el cumplimiento de los criterios fijados para indicar RO en Urgencias de Pediatría (UP) y de los indicadores de calidad de RIV.


MÉTODOS

- Estudio **observacional** por revisión de historias clínicas de niños con diagnóstico de vómitos y gastroenteritis aguda en UP de un hospital terciario en octubre de 2019.
- **Criterios fijados para indicar RO:**
 - Cualquier grado de deshidratación
 - TEP alterado
 - Cetonemia > 3 mmol/L
 - >3-4 vómitos en las últimas 1-2 horas
 - > 10 deposiciones en las últimas 4 horas.
- Indicador de calidad en RIV: realizar < 5%

RESULTADOS


Diagnósticos de GEA en octubre de 2019 en UP

301 casos



■ No DH ■ DH leve ■ DH moderada

RESULTADOS



RESULTADOS

	FRACASO REHIDRATACIÓN ORAL	REHIDRATACIÓN ORAL EFECTIVA	Nivel de significancia
TEP alterado	29%	7%	P <0,05
Cetonemia > 3 mmol/L	29%	30%	ns
Deshidratación moderada	14%	2%	ns

CONCLUSIONES

- La **RO**, con o sin ondansetrón, es **efectiva en la mayoría de niños** con GEA.
- El **factor que más ha influido en el fracaso de RO** y en realizar RIV de inicio es el **TEP alterado**.
- Porcentaje no despreciable de rehidrataciones no indicadas; en casi la totalidad de ellas la vía oral ha sido efectiva → se podrían haber realizado en domicilio.
- El **porcentaje de RIV obtenido**, cumple el **criterio de calidad establecido por la SEUP**.