

# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**



# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA  
REUNIÓN  
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

COMUNICACIÓN CORTA

Minimizar  
mejorar  
**Avanzar**

**Intoxicaciones en el niño mayor y el adolescente**



Servicio  
Canario de la Salud

**Barbadillo Villanueva D, López López S, Toledo Machado L, Núñez Borrero R, Alemán Rodríguez S, Mangione Cardarella L.** *Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.*



Gobierno  
de Canarias

# INTRODUCCIÓN

Con la maduración personal y la entrada en la adolescencia se observan cambios en las rutinas de nuestros pacientes. Aparecen nuevos peligros y tóxicos potencialmente graves que deben ser tratados por los servicios de urgencia.

# OBJETIVO

Analizar las características de las intoxicaciones de los pacientes entre 10 y 13 años que consultaron en el Servicio de Urgencias Pediátricas.




# METODOLOGÍA

- Estudio descriptivo transversal retrospectivo
- Pacientes de entre 10 y 13 años, entre los años 2015 y 2019 cuyo motivo de consulta estaba relacionado con una intoxicación.
- 227.113 consultas/798 (0,35%) por intoxicación/76 casos (9,5%) entre 10 y 13 años
- No se declaran conflictos de interés.
- Posibles sesgos: pérdida de información no diferencial en aquellos formularios mal redactados.




# RESULTADOS Distribución por edad y sexo N=76

Sexo



■ Masculino ■ Femenino

Edad en años




■ 10 ■ 11 ■ 12 ■ 13



# RESULTADOS Mecanismo de intoxicación y tipo de tóxico

## Mecanismo de intoxicación



## Tipo de tóxico



## CLÍNICA

A su llegada un 25% presentaron un TEP inestable.

El 20% presentó un Poisoning Severity Score de 2 y el resto de 1.

Un 94% presentó síntomas neurológicos.

## DESTINO

Un 20% precisó ingreso hospitalario.

Un 56% permaneció en observación.

Los ingresos, fueron por ingesta medicamentosa, tuvieron una estancia media de 3 días.

Fueron motivados en un 86% por intento autolítico y el resto, por finalidad ansiolítica.



# CONCLUSIONES

- Grupo de 13 años y femenino el más numeroso.
- El tóxico medicamentoso es el más encontrado.
- El mecanismo recreacional es el más frecuente.
- Preocupante número de intentos autolíticos.

