# XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA REUNIÓN VIRTUAL

**DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021** 



Minimizar mejorar **Avanzar** 



# REUNIÓN SEUP

**DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021** 

Minimizar mejorar **Avanzar** 

**COMUNICACIÓN CORTA** 

# Intoxicaciones polimedicamentosas en los últimos 5 años





# INTRODUCCIÓN

- Las intoxicaciones polimedicamentosas (IP): son aquellas que se producen por la ingestión de más de un medicamento.
- Son poco frecuentes: 3 % de las intoxicaciones en los niños.
- Son de mayor gravedad que las que se producen por la ingesta de un único fármaco.



### **OBJETIVO**

Analizar las características clínico epidemiológicas de los pacientes que acuden por IP a un servicio de Urgencias Pediátricas.







# **MÉTODOS**

- Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional
- Incluye consultas por IP en menores de 14 años registradas en Urgencias Pediátricas (2015-2019) en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias (CHUIMI)



Se atendieron 227.113 urgencias:



798 pacientes por intoxicaciones (0.35%)

21 pacientes por IP (2.6%)



Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Canarias





## Se analizaron las siguientes variables:

- Datos epidemiológicos:
  - Edad
  - Sexo
  - Mecanismo de intoxicación
  - Grupo de tóxico
- Datos clínicos:
  - Nivel de triaje
  - TEP
  - PSS (Poisoning Severity Score)
  - Tratamiento recibido en urgencias
  - Destino final








#### **RESULTADOS**

Distribución etaria				Mecanismo de
Edad (años)	Nº (n=21)	Sexo		intoxicación
		3	우	
1	4	1	3	Ac
2	2	1	1	Ac
3-5	3	3	0	Ac
6-9	1	0	1	As
10-13	11	3	8	Ac: 1 As: 1 At: 8 Otros: 1

Ac: accidental. As: ansiolítico. At: autolítico.



## **Poisoning SeverIty Score: (PSS)**

o Grado 0: (10)

o Grado: 1 (11)





- psicofármacos
- antilipídico
- antihistamínicos
- antirretrovirales
- antiparkinsoniano

- analgésicos
- antibióticos
- anticonceptivos
- antihipertensivos
- vitaminas







n:21











CA











12



0







CA: carbón activado LG: lavado gástrico UCI: ingreso en UCI

#### CONCLUSIONES

- El 2,6% de las intoxicaciones corresponden a IP
- La mitad de los afectados tenían entre 10-13 años
- Mecanismos de intoxicación más frecuentes: intentos autolíticos o finalidad ansiolítica



- Los fármacos mayoritariamente implicados en todas las edades fueron los psicofármacos
- Un porcentaje importante requirió estancia hospitalaria, aunque todos tuvieron buen pronóstico





