

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA


**Uso recreativo de los medicamentos: una
realidad entre los adolescentes**

Gotzens Bersch J, Martínez Sánchez L, Castany Capdevila E, Trenchs Sainz de la Maza V, Luaces Cubells C. *Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.*

Introducción y objetivos

Estudiantes de secundaria (ESTUDES):

- Hipno-sedantes sin receta: 8,2%
- Analgésicos opioides “para colocarse”: 2,2%
- ↑ prevalencia desde el inicio de la encuesta (1994)



Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes atendidos en un Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP) por intoxicación tras uso recreativo de medicamentos

Métodos

- Estudio retrospectivo-observacional
- Entre julio-2012 y noviembre-2020
- Pacientes < 18 años atendidos en un SUP por sospecha de intoxicación tras uso recreativo de medicamentos


La toxicidad se valoró mediante el *Poisoning Severity Score (PSS)*

GRADOS GRAVEDAD

- 0 = No toxicidad
- 1= Toxicidad leve
- 2= Toxicidad moderada
- 3= Toxicidad grave
- 4= Toxicidad letal

Poisoning Severity Score (PSS): Escala desarrollada y validada por la European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)

Resultados




Características epidemiológicas:

- 16 pacientes
- Sexo: 14 (87,5%) fueron varones
- Edad mediana: 14,6 años (13,3-16,1)

5 pacientes (31,3%) residían en centros de menores

Resultados

Fármacos implicados



El principio activo más frecuentemente implicado fue el metilfenidato


Policonsumo de sustancias en 9 casos (52,9%)

OTRAS SUSTANCIAS


Cannabis (n=9)
Alcohol (n=3)
Agente volátil (n=1)
Cocaína (n=1)

Resultados

Síntomas más frecuentes



Poisoning Severity Score



5 pacientes (29,4%) requirieron ingreso, 1 en UCIP (5,8%)

Conclusiones

- Los adolescentes consumen, en ocasiones, medicamentos con finalidad recreativa, lo que puede dar lugar a situaciones de compromiso vital
- Este consumo se asocia al sexo masculino, al de otras sustancias y a situaciones de riesgo social en un alto porcentaje de casos