

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Atención a adolescentes por intoxicación en la urgencia pediátrica.
Estudio descriptivo en un hospital de tercer nivel.**

Buendia de Guezala, A ; Caldeiro Diaz, M.J.; Docio Perez, P; Portal Buenaga, M; Fernández Cabo, V; Llorente Pelayo, S; Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Servicio de Pediatría, Santander, Cantabria.

INTRODUCCIÓN

Las intoxicaciones suponen el 0,3% de la patología atendida en un servicio de urgencias pediátrico; se distinguen dos grupos de edades con mayor incidencia, los menores de 5 años y los adolescentes. Los productos más implicados son los fármacos, seguidos de los productos del hogar, el etanol...

En los últimos años ha habido un cambio en la epidemiología, con aumento de las intoxicaciones por psicofármacos, así como, las intoxicaciones alcohólicas.

OBJETIVOS

Conocer la epidemiología de las intoxicaciones atendidas en las urgencias pediátricas enfocada en el grupo de los adolescentes; comparando con los últimos datos presentados a nivel nacional.

Comparar las diferentes etiologías en una misma localización en función de los rangos de edades atendidos en la misma.



MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo, que recoge los datos de pacientes atendidos en la urgencia de pediatría de un hospital de tercer nivel, desde el 1 de enero 2014 hasta el 1 de septiembre del 2018, incluyendo aquellos pacientes entre los 11 y 16 años.


Se dividió el estudio en dos segmentos temporales, el primero desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de mayo del 2016, en el cual se valoraban pacientes hasta los 14 años. En el segundo desde el 1 de junio del 2016 hasta el 1 de septiembre del 2018, en el cual se amplió la edad pediátrica de asistencia hasta los 16 años. Se realizó un estudio comparativo entre ambos grupos.

RESULTADOS


Se recogieron los datos de un total de 89 pacientes.



TÓXICOS IMPLICADOS




MOTIVO DE INTOXICACIÓN



Todos los intentos autolíticos fueron mediante la ingesta de fármacos.

- A su llegada a urgencia 75 pacientes presentaban sintomatología.
- Precisaron ingreso 55 pacientes, principalmente en la unidad de corta estancia pediátrica. Solo 3 pacientes precisaron ingreso en UCIP.

RESULTADOS




■ Grupo 1 ■ Grupo 2

En ambos grupos se mantiene la misma relación ♀66% - ♂33%



Grupo 1: 01/01/2014 - 31/05/2016

Grupo 2: 01/06/2016 - 01/09/2018



Comparando ambos grupos se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a las intoxicaciones por ocio y las intoxicaciones étlicas.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, respecto a la presencia de sintomatología a su llegada a urgencias, ni respecto al número de ingresos.



CONCLUSIONES

Al igual que en otros estudios realizados a nivel nacional, se aprecia un aumento en el número de intoxicaciones etílicas. En los adolescentes hay un predominio de intoxicaciones polimedicamentosas en contexto de intentos autolíticos, con predominio de los psicofármacos.

Al ampliar la edad pediátrica hasta los 16 años, se encuentra un aumento significativo en el número de intoxicaciones etílicas. Esto se relaciona de manera positiva con un aumento del número de pacientes con sintomatología en el momento de ser atendidos, así como, la necesidad de ingreso.