

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

Intentos de autolisis en urgencias pediátricas de un hospital de tercer nivel



INTRODUCCIÓN

Los intentos de autolisis en los pacientes pediátricos han aumentado en los últimos años de forma preocupante, convirtiéndose en una de las consulta psiquiátricas en los servicios de urgencias.

OBJETIVO

Analizar las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con intento de autolisis.

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo retrospectivo basado en las intoxicaciones en pacientes menores de 14 años con fin autolítico en Urgencias Pediátricas de un hospital de tercer nivel en el período de 2015-2019

RESULTADOS

n=20




Edad media 12,1 años

♀ 70%

♂ 30%

Tipo de Tóxico

Productos del hogar
15%




Medicamentosa
85%

Fármacos

Antidepresivos
12%

Benzodiazepinas
6%



Analgésicos
35%



Polimedamentosa
47%


RESULTADOS

n=20



Lavados
gástricos
1


Descontaminación




PPCC 70%

Éxito 0
Secuelas 1 (IRA)

Destino





CONCLUSIONES

- Los intentos de suicidio mediante intoxicación voluntaria son más frecuentes en mujeres adolescentes.
- El método más utilizado para el intento de suicidio mediante intoxicaciones fue la ingesta polimedamentosa.
- Un gran número de casos requirieron descontaminación digestiva e ingreso hospitalario.