

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Análisis de la prescripción antibiótica adecuada
en la Otitis media aguda**

Atiénzar Gallego R, Cerdán Oncalá S, Sanz Zafrilla E, De las Heras Gómez L, Poveda Cano M, Navarro Felipe A. *Complejo Hospitalario Universitario Albacete. Albacete.*

INTRODUCCIÓN

- La otitis media aguda constituye la **principal** causa de **prescripción antibiótica**.
- Existe una **prescripción** antibiótica **excesiva** consecuencia del **sobrediagnóstico**.
- Las guías proponen una **actitud expectante** con vigilancia estrecha, y reservar el **tratamiento** antibiótico para **grupos de riesgo de mala evolución**.

OBJETIVOS

- Analizar si existe una prescripción antibiótica adecuada en los pacientes diagnosticados de otitis media aguda en nuestro servicio de urgencias.




MÉTODOS

- **Estudio descriptivo retrospectivo** de los pacientes **atendidos** en el servicio de urgencias pediátrica del Complejo Hospitalario de Albacete **desde Septiembre hasta Diciembre de 2019**.
- **Criterio de inclusión:** Pacientes con diagnóstico al alta de otitis media aguda (0-14 años).
- **Variables analizadas:** edad, sintomatología, criterios de gravedad, tratamiento pautado, tipo de prescripción antibiótica, desarrollo de complicaciones



RESULTADOS

MOTIVO DE CONSULTA



SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019


6594 Pacientes

↓

318 (4,6%) OMA

TIEMPO EVOLUCIÓN FIEBRE


■ < 48 HORAS ■ > 48 HORAS




RESULTADOS

TRATAMIENTO



■ AMOXICILINA ■ AMOXI/CLAV ■ OTROS ATB ■ AINE



CRITERIOS DE ADECUACIÓN ANTIBIÓTICA > 2 AÑOS



TRATAMIENTO POR RANGO DE EDAD



CONCLUSIONES

- Teniendo en cuenta la mayoría de guías de práctica clínica y el documento de consenso sobre el tratamiento de la otitis media aguda **existe** una **sobreprescripción antibiótica** en nuestro servicio de urgencias.
- **Debido** en la mayoría de las ocasiones a **no** poder asegurar un **correcto seguimiento y reevaluación** en 48 horas.
- La **adopción** de **medidas** que contribuyan a mejorar la **adecuación clínica**, pueden ayudar a disminuir la indicación inadecuada de antibióticos en nuestro medio.

