


XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021


Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Crisis convulsivas y factores predictores de
recidiva en urgencias de pediatría**


Sánchez Sánchez A, Rodríguez González M, Estepa Pedregosa L, Romero Castillo E, Ramos Rodríguez A, Hernández González A.
Hospital Universitario Puerta Del Mar. Cádiz.





INTRODUCCION


Las convulsiones son unas de las urgencias neurológicas más frecuentes en Urgencias. Aunque la mayoría ceden en poco tiempo, su persistencia aumenta el riesgo de evolucionar a estatus convulsivo.



OBJETIVOS

Describir la incidencia y variables relacionadas con el riesgo de repetición de las crisis convulsivas, así como las pruebas diagnósticas y tratamientos realizados.






MÉTODOS

- ❑ Estudio retrospectivo descriptivo de los pacientes entre 1 y 14 años, que acudieron a urgencias de pediatría de un hospital de tercer nivel por episodio convulsivo a lo largo del año 2019.





MÉTODOS

Se registraron las siguientes variables:

- 1 Edad
- 2 Sexo
- 3 Mes de consulta
- 4 Pruebas complementarias
- 5 Tratamiento
- 6 Recidiva
- 7 Necesidad de hospitalización

Se incluyeron
163 episodios
en 132
pacientes





RESULTADOS

Edad

1-3
años

Sexo



Mes
consulta

Diciembre
Enero
Febrero

Antecedentes

Personales (50%)

- Conv. febril. (36%)
- Epilepsia (14%)

Familiares (17%)

Conv. febriles


51%

Procedencia

Domicilio (81%)

Centro Sanitario
(19%)





RESULTADOS

Recidivas

13% en Observación de Urgencias

A su llegada a Urgencias

- Convulsionando (9%): 5 pacientes evolucionaron a estatus
- Postcrítico (91%)


Pruebas complementarias

Tratamiento

Diazepam rectal	7
Diazepam rectal + iv	1
BZD iv	5
Valproico iv	3
Levetiracetam	3
Fenitoína	2


Destino

- Alta: 88% -> Consulta Neuropediatría 3%
- Planta Hospitalización: 12%
- UCI: 1 paciente



■ NO ■ ANALITICA ■ EEG ■ TAC





CONCLUSIONES

- ✓ La mayoría de los pacientes con crisis convulsivas acuden en estado postcrítico y pueden darse de alta a domicilio sin problemas tras un periodo limitado de observación.
- ✓ El mayor riesgo de recurrencia de las crisis en el mismo episodio ocurre en pacientes epilépticos, especialmente durante los meses de mayo-agosto, periodo en el que se producen más descompensaciones, algo a tener en cuenta a la hora de realizar una vigilancia más estrecha.
- ✓ Conocer los escalones terapéuticos optimiza nuestra actuación, sobre todo en las recurrencias.

