

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

**Atención a los traumatismos dentales en la urgencia de pediatría.
Estudio descriptivo en un hospital de tercer nivel.**

Buendia de Guezala, A ; Caldeiro Diaz, M.J.; Portal Buenaga, M; Docio Pérez, P; Fernández Cabo, V; Gomez Arce, A. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Servicio de Pediatría, Santander, Cantabria.

INTRODUCCIÓN

Según los datos de la AEPED 1 de cada 100 de las urgencias atendidas en hospitales de 3er nivel corresponden a patología bucodental; siendo los traumatismos dentales el principal motivo de consulta. Se atiende a un mayor número de varones que mujeres, así como, un predominio de pacientes en las edades tempranas de la vida, coincidiendo con los primeros pasos y el inicio de la edad escolar.

OBJETIVO



Conocer la epidemiología de los traumatismos dentales que se atienden en la urgencia de pediatría; incluyendo la actitud terapéutica ante los mismos.

MÉTODOS


Estudio descriptivo retrospectivo, donde se recogen los datos de los pacientes atendidos en la urgencia de pediatría de un hospital de tercer nivel. Se incluyeron aquellos pacientes atendidos entre el 1 de septiembre del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018; con edades comprendidas hasta los 16 años.

RESULTADOS

Se recogieron los datos de 48 pacientes.




La media de edad fueron 5,6 años.





LLEGADA A URGENCIAS

- Mañana 8:00-14:59
- Tarde 15:00-21:59
- Noche 22:00-7:59



RESULTADOS

En 28 de los casos, se encontró más de una patología.



- Durante su estancia en la urgencia 35 de los pacientes fueron valorados por la especialidad de cirugía maxilofacial; 3 de ellos precisaron seguimiento posterior.
- En 3 de los pacientes, se procedió a su recolocación dentaria por parte del maxilofacial. En 4 pacientes se realizó extracción dentaria urgente.
- Se derivaron a su dentista de referencia a 29 de los pacientes atendidos, y se indicaron recomendaciones higiénico-dietéticas en 31 pacientes.

CONCLUSIONES

Al igual que en la literatura clásica, en nuestro estudio se aprecia una predilección por el sexo masculino y por edades tempranas de la vida, en este tipo de patología.

Para una buena aproximación terapéutica es de gran importancia detectar aquellas patologías que precisan una atención urgente por el dentista, o por el servicio de maxilofacial; así como, la importancia de la derivación al dentista de referencia en todos los traumatismos dentales.