

XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021



Minimizar
mejorar
Avanzar



XXV REUNIÓN SEUP

PRIMERA
REUNIÓN
VIRTUAL

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN | 3 AL 6 DE MARZO DE 2021

Minimizar
mejorar
Avanzar

COMUNICACIÓN CORTA

Descriptivo de la patología traumatológica pediátrica y uso de analgesia en dos hospitales

Pérez Alba M¹, Elola Pastor AI², Pérez Pérez A², Fernández Rodríguez H¹, Rodríguez Suárez J², Lobeiras Tuñón A¹.

1 Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón, Asturias. 2 Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo, Asturias.



Los autores declaran no
tener conflicto de intereses



INTRODUCCIÓN

- La **patología traumatológica** es un motivo frecuente de consulta en Urgencias
- El síntoma principal es el **dolor**
- La valoración del paciente puede llevarse a cabo en un servicio de urgencias pediátricas (SUP) o un servicio de urgencias generales (SUG)

OBJETIVOS

- Describir las diferencias en el **manejo del dolor** en la patología traumatológica entre un SUP y un SUG




MÉTODO

- Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo
- Pacientes **menores de 14 años**
- **Traumatismo periférico** aislado
- Dos hospitales
- Periodo: **1 de junio hasta el 31 de agosto 2019**



RESULTADOS




- 402 varones (55.6%)
- Mediana de edad: 9.9 (RIC \pm 5.1)
- Nivel de triage: 506 pacientes (70%) nivel IV de Manchester



RESULTADOS

Analgesia

■ Si ■ No




30.2% vs 2%

Fármaco	SUP	SUG
Ibuprofeno	25 (36.8%)	3 (30%)
Paracetamol	3 (4.4%)	1 (10%)
Metamizol	12 (17.6%)	0
Morfina	27 (39.7%)	0
Otros	1 (1.5%)	3 (30%)
No consta	0	3 (30%)



RESULTADOS

Sedo-analgesia para procedimientos




71.2% vs 37.5%



CONCLUSIONES

- El **dolor se registra de forma deficitaria** en ambos hospitales
- Tanto el uso de analgesia como la sedo-analgesia durante los procedimientos es significativamente **mayor por parte de los pediatras**, aunque no se puede establecer la adecuación de la misma
- El uso de analgésicos menores es similar, pero el uso de analgésicos mayores es casi exclusivo de los pediatras





SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Área Sanitaria V

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE CABUEÑES

Muchas gracias 